

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y SITUACION ACTUAL DE *Brotogeris versicolurus* EN LA ARGENTINA

JORGE R. NAVAS

Museo Argentino de Ciencias Naturales, División Ornitología
Av. Angel Gallardo 470. (1405) Buenos Aires

NELLY A. BÓ

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Depto. Zoología Vertebrados
Paseo del Bosque. (1900) La Plata

The distribution of the Canary-winged Parakeet in Argentina

Abstract. The distribution of the Canary-winged Parakeet, *Brotogeris versicolurus*, in Argentina is not well known. It has been mentioned for the provinces of Salta, Formosa, Chaco and Misiones. Except the data from Formosa, where it was collected, all the rest of the records are visual. In the present paper we discuss the status of the specie population and the subspecies distribution throughout the country.

Key words: *Brotogeris versicolurus*, distribution, Argentina.

Palabras clave: *Brotogeris versicolurus*, distribución, Argentina.

El área geográfica ocupada por la Catita Chirirí, *Brotogeris versicolurus*, en la Argentina es notoriamente confusa, pues existen muy pocas citas concretas y otras de dudosa verificación. Es una especie de origen tropical y subtropical, rara en nuestro país, donde llega escasamente representada. Ha sido mencionada por diversos autores como habitante de las provincias de Salta, Formosa, Chaco y Misiones. No obstante, todos esos registros necesitan ser esclarecidos y con ese propósito se examinaron las colecciones ornitológicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires (MACN), de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán (FML) y del Museo de La Plata (MLP). En esta última institución no existen pieles de esta catita de procedencia argentina. Asimismo, se consultaron la bibliografía pertinente y a varias personas autorizadas en el tema, a quienes agradecemos su valiosa cooperación.

Dos razas geográficas de esta especie han sido señaladas para la Argentina: *Brotogeris versicolurus chiriri*, para Formosa, Chaco y Misiones, y *B. v. behni* para Salta. Algunos autores más recientes (e.g. Forshaw 1973 y Sibley y Monroe 1990) sugieren que la raza *chiriri* puede ser en cambio una buena especie separada de

versicolurus y, en este caso, *behni* pasaría a ser raza de la nueva especie *chiriri*. Sin embargo, Sibley y Monroe (1990) no reconocen a *behni* como buena subespecie.

Brotogeris versicolurus chiriri (Vieillot 1818). Esta subespecie de la Catita Chirirí ha sido mencionada por primera vez para la Argentina, en la provincia de Misiones, por Dabbene (1910), siguiendo a Holmberg, según dice, pero sin indicar el origen de la cita. No obstante, Holmberg (1878, 1887 y 1898) no la incluye para aquella provincia. Quizás la cita en cuestión se deba a una comunicación verbal posterior de un autor a otro o tal vez a un error, pues en muchos años después nadie volvió a registrarla para Misiones. Es interesante destacar que W.H. Partridge, que reunió un abundante material ornitológico en casi toda esa provincia, durante los años 1949 a 1960, nunca la observó ni la coleccionó.

Anónimo (1983 y 1988) hace figurar la Catita Chirirí como observada en el Parque Nacional Iguazú. Al respecto, hemos consultado a los naturalistas J. C. Chebez, M. Castelino, M. Rumboll y R. Straneck, los cuales son muy buenos conocedores de la avifauna misionera, y nos

han informado que la especie ha sido avistada en varias oportunidades, y en pequeñas bandadas de dos a diez individuos, solamente en la zona urbana de Puerto Iguazú, desde julio de 1987 hasta noviembre de 1995, y no en el mismo parque nacional. Sin embargo, Nores e Yzurieta (1994) afirman que S. Salvador registró dos individuos en el referido parque, el 7 de julio de 1985.

Es probable que esta catita se haya expandido en los últimos años, en forma natural y siguiendo la deforestación, hacia el norte de Misiones ya que la raza *chiriri* habita en zonas vecinas del Paraguay y en Mato Grosso do Sul, donde es relativamente común. Por otro lado, tampoco es descartable la posibilidad de que, las aves misioneras, sean escapadas de cautiverio, puesto que es una especie de Psitácido muy perseguida por los traficantes de aves vivas y en varias partes de América del Sur ha sido introducida, advertida o inadvertidamente, y se han naturalizado en forma conveniente (e.g. Chebez y Bertonatti 1991).

La mención de la Catita Chirirí para la provincia del Chaco se ha hecho teniendo en cuenta la cita de Dabbene (1914), basada en Holmberg (1898) según anota, pero este último autor, en cambio, no la registra para esta provincia en ese trabajo y quizás se deba también a una equivocación de aquel autor. Orfila (1938) la incluye para el "chaco central", de acuerdo a un ejemplar del MACN obtenido en octubre de 1906 por Otto Asp y Emilio Budin, sin localidad especificada. Hasta principios del presente siglo, como "chaco central" era conocida la región comprendida entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, o sea la actual provincia de Formosa, a pesar de que ya existía, desde 1884, la antigua gobernación de este último nombre (Cf. Fontana 1881). En consecuencia, esta cita no sería válida para la provincia del Chaco.

Darrieu (1981) adjudica, el aludido ejemplar del "chaco central" al extremo nordeste de la provincia de Salta, región que, en gran parte, se encuentra también entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, aunque esta región era conocida más bien como "chaco salteño" y no "chaco central".

De todos modos, Contreras *et al.* (1990), expresan que la catita en cuestión es muy rara en el Chaco y sólo ha sido registrada, en el mes de agosto, en el noroeste de la provincia, cerca del curso del río Bermejo-Teuco. Este registro ha sido tomado por ese autor del informe inédito

de Cajal (1983), quien la observó en Campo Grande, localidad ubicada en el extremo noroeste de la provincia, a unos 50 km al noroeste de Fuerte Esperanza y a otros tantos del río Bermejo-Teuco, en el departamento General Güemes. En el mismo trabajo de Contreras citado, se señala además su presencia en un paraje sobre el río Teuco situado algo más al sudeste de Campo Grande, sin mencionarse de dónde procede esta mención, aunque tal vez sea también tomado del informe de Cajal.

La presencia de esta subespecie en la provincia de Formosa es la más cierta y concreta, pues existe material coleccionado y determinado como perteneciente a la raza *chiriri*. La primera mención es la de Laubmann (1930), que coleccionó en noviembre de 1925, tres ejemplares en Misión Tacaaglé. Más tarde, fueron capturados cinco especímenes en septiembre y octubre de 1951, en Ingeniero Juárez y en La Florencia, que se conservan en las colecciones ornitológicas de la FML y del MACN. En este último museo se guarda el ejemplar mencionado anteriormente del "chaco central", sin localidad especificada, que seguramente, como se ha explicado, debe corresponder a Formosa.

Por otro lado, Contreras (1993) manifiesta haber observado, en el extremo sudeste del departamento Laishí, entre General Mansilla y Puerto Fotheringham (Colonia Cano), once individuos, en distintas ocasiones, entre julio de 1992 y diciembre de 1993. A pesar de ello, A. Di Giacomo (*in litt.*) nos informa que luego de un año de observaciones (1995-1996), en la Reserva El Bagual, situada cerca del pueblo de San Francisco de Laishí, nunca vio ni tiene referencias de la Catita Chirirí en la zona. A. Yanosky tampoco la registró en El Bagual durante los siete u ocho años de residencia en esa reserva ecológica, de acuerdo a una lista avifaunística suya inédita, cuyo detalle nos proporciona también A. Di Giacomo.

Con todo, Nores e Yzurieta (*loc. cit.*) anotan, basándose en una comunicación verbal de G. Sartori y P. Cichero, que esta especie fue observada en la citada reserva ecológica, en 1987, sin especificar número de individuos. Hasta el momento no ha sido registrada en el Parque Nacional Río Pilcomayo.

Con respecto a su presencia en la provincia de Corrientes, Contreras *et al.* (*loc. cit.*) se refieren a "su virtual extinción en Corrientes", empero, desconocemos el origen de esta afirmación,

puesto que esta catita no tiene registros publicados para esta provincia.

En resumen, la raza *chiriri* ha sido coleccionada u observada en el oeste (Ing. Juárez y La Florencia) y el sudeste de Formosa, respectivamente, y sólo avistada en el noroeste del Chaco (Campo Grande) y extremo noroeste de Misiones (Puerto Iguazú y Parque Nacional Iguazú).

Brotogeris versicolurus behni Naumann 1931. Peters (1937) menciona esta subespecie por primera vez para la Argentina y dice: "Las aves del noroeste argentino (Salta) pertenecen sin dudas a esta raza", quizás basándose en la cita de Dabbene (1910) y éste a su vez en el registro de Holmberg (1878), para las cercanías del río Las Piedras, departamento Metán (ruta 34), provincia de Salta, quien observó una bandada de diez o doce individuos, el 23 de marzo de 1877. No se sabe si Holmberg llegó a capturar o no ejemplares de esta catita y, por lo tanto, queda la duda de su determinación subspecífica.

Olog (1963) afirma que la raza *behni* fue "capturada en el extremo norte de Salta" y este mismo autor (1979) la señala como habitante del norte de Salta. No obstante, en la colección de la FML, a la que solicitamos información y donde se supone que podría haber algún espécimen de esta subespecie procedente del noroeste argentino, coleccionada o consultada por este autor, no existe material alguno al respecto. Tampoco se conoce publicación con detalle concreto de material coleccionado.

Forshaw (*op. cit.*) solamente la da como probable para el norte de Salta. Contreras *et al.* (*op. cit.*) suponen que la población del noroeste chaqueño (Campo Grande) podría pertenecer a la raza *behni*. A este respecto podemos comentar que las pieles coleccionadas en Ing. Juárez y La Florencia, provincia de Formosa, ya mencionadas, pertenecen a la subespecie *chiriri*, lo mismo, suponemos, que las de Campo Grande, puesto que todas estas localidades están separadas sólo por unos 55-80 km entre ellas y en un ecoambiente similar.

Por todo lo manifestado, estimamos que la presencia de la raza *behni* en la provincia de Salta, basada en las observaciones de Holmberg (1878) y en su supuesta captura (Olog 1963), no tiene fundamento sólido. En consecuencia, creemos que esta subespecie debe ser eliminada de la avifauna argentina hasta su comprobación fehaciente.

Esto no quita que *Brotogeris versicolurus* pueda habitar todavía en la provincia de Salta, aunque desde las observaciones de Holmberg y Olog nunca se la volvió a citar concretamente en el noroeste argentino. Hoy *et al.* (1963), en su extensa lista de aves coleccionadas en Salta y Jujuy, durante muchos años de búsqueda y observaciones, no incluyen esta especie.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- ANÓNIMO. 1983 y 1988. Lista de las aves del Parque Nacional Iguazú. Adm. Parques Nacionales.
- CAJAL, J.L. 1983. Informe Impenetrable, Chaco. Inf. inéd. Buenos Aires.
- CHEBEZ, J.C. y C.C. BERTONATTI. 1991. Sobre la presencia de algunos loros subtropicales en Buenos Aires y sus alrededores. *Aprona* N° 19.
- CONTRERAS, J.R. 1993. Acerca de algunas especies de aves del extremo sudeste de la provincia de Formosa, República Argentina. *Nótulas Faunísticas* N° 47.
- CONTRERAS, J.R., L.M. BERRY, A.O. CONTRERAS, C.C. BERTONATTI y E. UTGES. 1990. Atlas ornitogeográfico de la provincia del Chaco, República Argentina. I No Passeriformes. Cuadernos Técn. F. de Azara N° 1.
- DABBENE, R. 1910. Ornitología argentina. *An. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires* 18: I-XIV + 1-513.
- 1914. Distribution des oiseaux en Argentine. *Bol. Soc. Physis* 1:293-366.
- DARRIEU, C.A. 1981. Distribución y características diferenciales de las razas geográficas de *Brotogeris versicolurus* (Muller). (Aves, Psittacidae). *Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral* N° 12: 60-69.
- FONTANA, L.J. 1881. El Gran Chaco. Buenos Aires. (Ver también el "Estudio preliminar" de la edición de 1977. Solar/Hachette, Buenos Aires).
- FORSYTH, J.M. 1973. *Parrots of the world*. Doubleday & Co. Garden City, N. York.
- HOLMBERG, E.L. 1878. Contribuciones para el conocimiento de la fauna de Salta. *Nat. Arg.* 1: 83-96.
- 1887. Viaje a Misiones. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba* 10: 1-391.
- 1898. Segundo censo de la República Argentina (1895). *Fauna argentina, Aves*. Vol. 1: 494-574.
- HOY, G., F. CONTINO, y E.R. BLAKE. 1963. Addendas a la avifauna argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc., Córdoba* 43:295-308.
- LAUBMANN, A. 1930. *Wiss. Ergeb. Deutschen Gran Chaco-Expedition*. Vögel. Stuttgart.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1994. The status of Argentine parrots. *Bird Conserv. Internat.* 4: 313-328.
- OLROG, C.C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. *Op. Lilloana* 9: 1-377.
- 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Op. Lilloana* 27: 1-324.
- ORFILA, R.N. 1938. Los Psittaciformes argentinos. *Hornero* 7: 1-21.
- PETERS, J.L. 1937. *Check-list of birds of the world*. Vol. 3. Cambridge.
- SIBLEY, C.G. y B.L. MONROE. 1990. *Distribution and taxonomy of the birds of the world*. Yale Univ. Press, New Haven.