

NUEVOS REGISTROS DE AVES URUGUAYAS

ADRIÁN S. DI GIACOMO¹

ABSTRACT. New records from uruguayan birds. Between 1987-1990 I visited 12 times "Termas del Río Dayman" (13 km SE from Salto, Uruguay). I recorded 130 species and give information on 10 species.

Entre los años 1987 y 1990 se realizaron 12 visitas a las Termas del Río Dayman, situadas a 13 km al SE de la ciudad de Salto, depto. Salto, República Oriental del Uruguay. Diez de las salidas fueron hechas en otoño e invierno, y las dos restantes en primavera. Las observaciones se hicieron en la periferia del complejo termal, principalmente en la angosta faja de selva marginal del río Dayman.

Se registraron 130 especies, 10 de las cuales por su interés biogeográfico se comentan a continuación.

***Pandion haliaetus* Aguila Pescadora**

24 may 1987. Un ejemplar en vuelo sobre el río frente a las termas. 10 jul 1987, tres volando sobre el río, y otro sobrevolando la selva. 12 jul 1987, un ejemplar en el río frente a las termas. 11 oct 1987, uno en vuelo sobre el río; y otro sobre la selva, 1 km río arriba.

En el Uruguay según Escalante (1983) la especie ha sido avistada reiteradamente desde 1959 en el S (deptos. San José, Canelones y Maldonado), sobre el litoral marítimo. Los registros para el río Dayman serían los primeros para el N, y en aguas continentales.

Nores e Yzurieta (1981) la registraron en territorio argentino cerca del área visitada: Salto Grande y Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

***Buteogallus urubitinga* Aguila Negra**

15 oct 1989, un joven. 16 oct 1989, un adulto volando a baja altura sobre el río. 28 jul 1990, un adulto sobrevolando el área. No existen registros anteriores para el depto. Salto.

***Melanerpes candidus* Carpintero Blanco**

Entre el 17 y 19 jun 1990, se observaron tres grupos de entre 5 y 10 ejemplares en vuelo alto sobre campos y palmares. Entre los días 26-28 jul 1990 y 17-20 ago 1990 se vieron varios en postes de electricidad muy cerca de los poblados. Estos registros, sumados a los de Arballo (1990), indicarían una posible expansión y aumento en la población local de la especie.

***Synallaxis spixi* Pijú Plomizo**

17 ago 1987, un ejemplar en matorrales selváticos. Ha sido considerado "común" para los deptos. del S y "raro" en el N (Gore y Gepp 1978). Registrado en Tacuarembó (Cuello y Gerzenstein 1962). No existen registros para el depto. Salto.

***Riparia riparia* Golondrina Zapadora**

10 y 11 oct 1987. Por la mañana se veían en grupos dispersos. De tarde se reunían formando una densa bandada de varios cientos de ejemplares, que volaban sobre el río y la selva.

La única cita para el país corresponde a uno o dos individuos observados por Peter y Alfredo Gepp en Montevideo el 8 ago 1974 (Cuello 1975). El registro de Dayman sería el segundo. En Cuello (1985) aparece en el "grupo de especies citadas para el Uruguay, cuya presencia necesita ser confirmada con el aporte de ejemplares obtenidos en el país".

***Saltator similis* Pepitero Verdoso**

24 may 1987, un ejemplar recorriendo el sotobosque de la selva. 16 jun 1989, otro en un borde de selva.

Estos serían el tercer y cuarto registro de la especie para el Uruguay, y los más australes. Cuello y Gerzenstein (1962), mencionan 2 individuos capturados en Espinillar, depto. Salto, el 4 oct 1958. Gore lo observó cerca de la ciudad de Artigas el 4 nov 1972 (Gore y Gepp 1978).

***Cyanoloxia glaucocaeerulea* Reinamora Chica**

El 10 jul 1987, un macho en el monte inundado de una isla; 10-12 oct 1987, varios ejemplares en matorrales densos, en periferia de la selva; 14-16 oct 1989, muchas parejas incluso en actitud reproductiva con despliegues territoriales, en la periferia de la selva; 17-20 ago 1990, una pareja en un área de recreo, entre vegetación exótica. Citada para Artigas y algunos deptos. del S (Cuello y Gerzenstein 1962), pero no se conocen otros registros para el N.

***Sporophila collaris* Corbatita Dominó**

1 may 1989, varios ejemplares en matorrales de la orilla del río.

Este registro sería el más boreal para el Uruguay. Señalado para los deptos. San José (Cuello y Gerzenstein 1962), Cerro Largo (Gore y Gepp 1978), Treinta y Tres (Gambarotta 1985) y Rocha (Arballo 1990).

***Poospiza lateralis* Monterita Litoral**

En numerosas oportunidades (23-25 may 1987, 15-17 ago 1987, 10-12 oct 1987, 11-13 jun 1988, 16-19 jul 1989, 17-19 jun 1990 y 25-29 jul 1990) se la observó en grupos de hasta 10 ejemplares, a menudo junto a *Thamnophilus caeruleus*.

Citada para la mayoría de los deptos., especialmente del N y centro del país (Cuello y Gerzenstein 1962), pero sin registros puntuales para Salto.

***Carduelis chloris* Verderón**

24 may 1987, un individuo en la copa de un sauce (*Saxifraga*) del complejo termal.

Registrado en los deptos. de la costa del Río de la Plata (Gore y Gepp 1978). Este sería el primer dato de la especie para el N del país.

AGRADECIMIENTOS

A la familia Alban, que amablemente me permitió trabajar en el área de estudio. A T. Narosky y A. G. Di Giacomo por su colaboración en la redacción.

Rec: may 1992; acep: mar 1994.

¹ Suipacha 1111, 1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Arballo, E. 1990. Nuevos registros para la avifauna uruguaya. *Hornero* 13:179-187.
- Cuello, J. F. 1975. Las aves del Uruguay. *Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo* 10:1-27.
- Cuello, J. F. y E. Gerzenstein. 1962. Las aves del Uruguay. Lista Sistemática, distribución y notas. *Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo* 6:1-191.
- Cuello, J.F. 1985. Lista de Referencia y Bibliografía de las Aves Uruguayas. Mus. D. A. Larrañaga, Int. Mun. de Montevideo. Montevideo.
- Escalante, R. 1983. Nuevos registros del Ostrero Negro (*Haematopus ater*) y del Aguila Pescadora (*Pandion haliaetus*) en el Uruguay. *Res. Jorn. Cient. Nat. Montevideo* 3:26.
- Escalante, R. 1965. Notas sobre el Aguila Pescadora y el Atf o Gaviotín de Pico Grande en el Uruguay. *Hornero* 10:277-278.
- Gambarotta, J. C. 1985. Presencia de *Mimus triurus* (Mimidae) y *Tangara preciosa* (Thraupidae) en el ambiente urbano y nuevo registro de *Sporophila collaris* (Emberizidae) para Uruguay (Passeriformes). *Act. Jorn. Zool. Uruguay*: 79.
- Gerzenstein, E. y J. I. Muñoa. 1958. Aves cazadas y observadas en Espinillar (Depto. de Salto). *Com. Zool. Mus. Nac. Hist. Nat. Montevideo* 4:1-14.
- Gore, M. E. y A. R. Gepp. 1978. Las Aves del Uruguay. Mosca Hnos. Montevideo.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. *Hist. Nat.* 2:33-42.

Homero 14: 72-73

NUEVAS LOCALIDADES PARA AVES ARGENTINAS. PARTE VIII.

MANUEL NORES¹ Y DARÍO YZURIETA²

ABSTRACT. New data on geographic distribution of 12 species of Argentine birds are given. They come from surveys carried out from 1987 to 1992 in different parts of Argentina.

En este trabajo para 12 especies de aves se amplía la distribución conocida en Argentina, o se confirma su presencia en algunas provincias. Las nuevas citas son el resultado de varios relevamientos realizados entre 1987 y 1992, en diferentes partes de la Argentina.

LISTA DE ESPECIES

Fregata magnificens

Un ej. observado en Puerto Belgrano, Pdo. de Punta Alta, Buenos Aires, el 30 oct 1989. La especie había sido citada hasta Necochea (Döke 1985).

Cathartes burrovianus

Dos ej. observados en las cercanías de Miramar, costa S de la Laguna Mar Chiquita, depto. San Justo, Córdoba, el 16 ene 1991. La especie era conocida del E de Formosa y Chaco, N de Santa Fe, Misiones y Corrientes (Olrog 1979) y de Santiago del Estero (Nores *et al.* 1991).

Buteogallus urubitinga

Un ej. observado en Las Higuerillas, depto. Paclín, Catamarca el 11 ene 1987, en el límite con Tucumán. La especie era conocida desde el N del país hasta Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires (Olrog 1979), y además Mendoza (Contreras 1979).

Columba picazuro

Unos 4-5 ej. fueron observados en San José del Morro, al pie de la Sierra del Morro, depto. General Pedernera, San Luis, el 11 ene 1990. La especie era conocida desde el N del país hasta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires (Olrog 1979) y Río Negro

(Meyer de Schauensee 1966 y obs. pers.: Viedma, sobre el Río Negro), pero no había localidades concretas para San Luis.

Hylocharis chrysurus

Un ej. observado en Argüello, depto. Capital, Córdoba, en dos oportunidades: el 17 ago 1987 y el 15 ago 1988. La especie era conocida desde el N del país hasta Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires (Olrog 1979).

Spartonoica maluroides

Fueron registrados 4-5 ej. en Colonia Vélez, depto. Bermejo, Chaco, el 9 jun 1989. La especie era conocida de Río Negro, Mendoza, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos (Olrog 1979), Santa Fe (Vaurie 1980) y Corrientes (Darrieu 1986).

Myrmochilus strigilatus

Un ej. fue escuchado y observado en una pequeña serranía situada al E de la localidad Laguna de Robles, depto. Burruyaca, Tucumán, el 20 ene 1988. La especie era conocida de Salta, Jujuy y Formosa (Olrog 1979), Santiago del Estero (Nores y Yzurieta 1983), Santa Fe (Giai 1950) y Chaco (Narosky 1983).

Ochthoeca leucophrys

Un ej. observado a 26 km al W de Purmamarca, depto. Tumbaya, Jujuy, el 25 ene 1987. La especie era conocida de Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan (Olrog 1979) y Salta (Hoy 1969).

Phaeoprogne tapera

Un ej. observado en Cabo Vírgenes, depto. Güer Aike, Santa Cruz, el 11 nov 1989. La especie era conocida desde el N del país hasta La Pampa y Mendoza (Olrog 1979) y además Chubut (Chebez 1980).

Catharus ustulatus

Un ej. observado en Talaguada (10 km al N de La Merced), depto. Paclín, Catamarca, el 11 ene 1987. La especie

Rec: nov 1993; acep. oct 1994

1 Centro de Zoología Aplicada. C.C. 122, 5000 Córdoba, Argentina.

2 Costa Canal 420, 5147 Argüello, Córdoba, Argentina.