

SOBRE LOS NIDOS DEL « FEDERAL »

AMBLYRHAMPHUS HOLOSERICEUS (Scop.)

Y DEL « PECHO COLORADO »

LEISTES MILITARIS SUPERCILIARIS (Bp.)

Los dos nidos representados en las fotografías y pertenecientes a las especies nombradas, son de los más difíciles de encontrar; por cuyo motivo creo serán interesantes estas breves noticias.



Nido del federal (*Amblyramphus holosericeus*) (1a)

El nido del federal, está siempre situado entre las pajas altas que crecen en las lagunas y a una altura de poco más de un metro sobre el nivel del agua. Para construirlo el ave ata primeramente varias hojas de espadaña ó de juncos, por medio de cintas de paja, entonces empieza a tejer el nido con este mismo material hasta darle la forma indicada en la fotografía.

El nido del pecho colorado chico, está construido con yerba seca y siempre se encuentra en el suelo,

muy escondido entre el pasto. El nido representado en la fotografía y recogido en Quilmes, por el señor DEMETRIO RODRÍ-



Nido del pecho colorado (*Leistes militaris superciliaris*) (1/2).

GUEZ, contenía dos huevos del propietario del nido y dos del tordo negro: *Molothrus bonariensis* (GM.) su habitual parásito.

R. DABBENE.

COSTUMBRES DE UN DENDROCOLÁPTIDO

PSEUDOSEISURA LOPHOTES (REICHENB.)

Durante los meses de Septiembre, Octubre y hasta mediados de Noviembre de 1916, estuve coleccionando aves en las estancias del señor don CARLOS GUERRERO, situadas en la región limítrofe de San Luis, La Pampa y Córdoba.

En la esperanza de que puedan ser interesantes, creo oportuno transcribir de mi libreta de apuntes, las siguientes observaciones que tuve ocasión de hacer sobre las costumbres y nidificación de una especie bastante común en aquellos parajes, vulgarmente denominada allí « come-huevos » (« caserote » en Entre Ríos, y « cachalote » en Córdoba), y científicamente *Pseudoseisura lophotes* (REICHENB.)

Se trata de un pájaro de tamaño un poco mayor que el