

Material Suplementario para:

EFFECTO DEL RUIDO, COBERTURA ARBÓREA Y HORA DEL DÍA SOBRE LA DETECTABILIDAD DE AVES
EN ECOSISTEMAS URBANOS

JECAR RODRÍGUEZ-ARANCIBIA¹, MARTÍN A. H. ESCOBAR^{1*} & NÉLIDA R. VILLASEÑOR^{1,2}

Anexo 1. Resultados de los modelos jerárquicos de Royle et al. (2004) en relación con las covariables ajustadas para la abundancia en las seis especies de aves. Significancia

estadística: $P < 0.1$; * = $P < 0.05$; ** = $P > 0.01$; *** = $P < 0.001$.

Especie	Intercepto	Covariables para la abundancia		
		Cobertura leñosa	Log(cobertura herbácea)	Superficies impermeables
<i>Z. capensis</i>	2.78***	0.04	0.12	0.06
<i>T. falcklandii</i>	2.87***	0.26***	0.38**	-0.47***
<i>Z. auriculata</i>	2.78***	-0.03	0.04	-0.54***
<i>P. domesticus</i>	2.68***	-0.02	0.25*	0.26*
<i>T. aedon</i>	2.55***	-0.06	0.73	-0.24
<i>E. albiceps</i>	2.91***	-0.64**	-0.76***	-1.09***