

NUEVOS REGISTROS DE AVES EN EL NOROESTE ARGENTINO

ALEJANDRO G. DI GIACOMO¹, ADRIÁN S. DI GIACOMO¹, BERNABÉ M. LÓPEZ LANÚS¹

Y ANGEL CARADONNA²

ABSTRACT. First record for Argentina of the Pearled Treerunner (*Margarornis squamiger*) and new data on the geographic distribution of the Ornate Hawk-Eagle (*Spizaetus ornatus*), Yellow-headed Caracara (*Milvago chimachima*), Purplish Jay (*Cyanocorax cyanomelas*), Swallow-Tanager (*Tersina viridis*) and Blue-naped Chlorophonia (*Chlorophonia cyanea*) in NW Argentina are given.

Damos a conocer una serie de registros que amplían la distribución de varias especies de aves en el NW argentino (NOA), resultado de viajes realizados por los autores a las provincias de Salta y Jujuy, con motivo de los relevamientos ornitológicos de los Parques Nacionales Baritú y Calilegua, respectivamente. También se incluye información de terceros, recopilada con los mismos fines.

Spizaetus ornatus

Esta águila ha sido reiteradamente mencionada para el NOA, aunque sin conocerse hasta el momento citas concretas, opinión compartida por de Lucca (1992) y Chebez (1994).

Al parecer es Olrog (1959) el primer autor en anotar Salta, Jujuy y Tucumán en la distribución de la especie. En un trabajo posterior (1963) precisa aún más estos datos diciendo que habita el extremo N de Salta y SE de Jujuy. Allí elimina Tucumán, que en forma errónea habían citado Hellmayr y Conover (1949), sobre información de Dabbene (1926), mencionando que la misma pertenece a *Spizastur melanoleucus*. Otro registro, también sin detallar, es el de Hoy *et al.* (1963) cuando listan la especie entre las aves colectadas hasta 1962 en el NOA "desde Chaco Salteño hasta el Altiplano y la Cordillera".

Se citan aquí tres registros para el PN Calilegua. El 30 oct 1991, A. G. Di Giacomo y Caradonna, observaron un ej. asentado en un árbol seco, junto a dos *Cathartes aura*. Permaneció quieto por más de 10 minutos, para luego volar y perderse entre la vegetación. El 3 nov 1991, Caradonna junto a R. Straneck, R. Ridgely, J. Rodríguez Mata, G. Tudor, K. Berlin y M. Weinberger vieron un águila de esta especie posada en un cebil (*Anadenanthera macrocarpa*) que se alejó al paso de un vehículo. Al día siguiente, A. G. Di Giacomo observó otro individuo que volaba bajo y rápido sobre el dosel de la selva, llevando entre las garras lo que parecía ser una presa. Muy probablemente estos tres avistajes podrían estar referidos a un mismo ej., registrado en las cercanías de los parajes Totoritas (850 msnm) y Estaca El Cero (900 msnm).

Estos hallazgos, junto a los dados a conocer por de Lucca (1992) para Misiones, son los más recientes luego de varios años de casi no contar con avistajes modernos en Argentina (Olrog 1985, de Lucca 1992) de una rapaz cada vez más escasa (Olrog 1985, Chebez 1992) y ya amenazada de extinción (Navas y Bó 1991).

Milvago chimachima

El 2 ago 1991 un ej., asentado sobre el lomo de un vacuno, fue observado por A. S. Di Giacomo en cercanías de Gral. Güemes, depto. homónimo, provincia de Salta.

La distribución de la especie en nuestro país comprende Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y N de Santa Fe (Olrog 1979), además de antiguos registros para Buenos Aires (ver Narosky y Di Giacomo 1993). Por su parte Canevari *et al.* (1991), coinciden en su texto con esta distribución, pero en el mapa incluyen también el N de Santiago del Estero y el E de Salta, provincia para la cual no parecen conocerse hasta el momento citas concretas.

Margarornis squamiger

Un ej. fue observado por López Lanús el 13 nov 1992 en la Serranía de las Pavas, límite E del PN Baritú. Recorría el estrato medio, entre los 3 y 7 m de altura, en la selva densa de una ladera. Buscaba alimento entre los musgos colgantes de las raíces y guías de maromas (*Ficus maroma*).

Descripción de campo: corona y cuello dorsal pardo uniformes, partes dorsales y alas rufas, fina línea ocular negra, notables garganta y ceja ocre, partes ventrales pardo oscuras conspicuamente moteadas de ocre, más aún en pecho, cola rufa con rectrices terminadas en espinas.

Especie nueva para la avifauna argentina, distribuida por la Cordillera de los Andes desde el NW de Venezuela hasta Bolivia (Fjeldsa y Krabbe 1990) donde es conocida para los deptos. de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (Bond y Meyer de Schauensee 1942, Remsen *et al.* 1986).

Cyanocorax cyanomelas

Esta especie era sólo conocida en el NOA por un dato para las cercanías de Acambuco, Sierras de Tartagal, Salta (Nores y Yzurieta 1983).

A mediados ene 1991, un individuo fue observado por Caradonna en Aguas Negras, PN Calilegua, formando parte de un grupo de *C. chrysops*. El 15 y 16 ago 1992 fue vista por A. G. Di Giacomo y Caradonna en Las Juntas (ríos Lipeo y Bermejo, 500 msnm), Seccional Nogalitos, en el ángulo NE del PN Baritú, en la frontera argentino-boliviana. El día anterior fue registrada varias veces, aunque en territorio boliviano, en el sector de la ruta Panamericana que allí bordea el río Bermejo, frente al parque nacional. El 11 y 12 ago 1993 en un recorrido de unos 20 km por el río Lipeo, aguas arriba desde Las Juntas, este córvido fue anotado por A. G. Di Giacomo en 6 ocasiones, en parejas o grupitos de 3 ó 4 ejes. El día 24, se encontraron 3 individuos en la quebrada del arroyo Santelmita (o San Telma Grande), cerca de su desembocadura en el río Lipeo.

Estos datos permiten señalar a *C. cyanomelas* por vez primera para Jujuy, y aportar nuevas localidades para Salta.

Rec: oct 1994; acep: may 1995.

¹ Asociación Ornitológica del Plata. 25 de Mayo 749, 2° 6, 1002 Buenos Aires
² Av. Victoria Aguirre 66. CC 54, 3370 Puerto Iguazú, Misiones

La casi ausencia de registros en el NOA, parece deberse más bien a lo poco prospectado del área, ya que al menos en el extremo N de Salta es relativamente frecuente. Además está ampliamente difundida en Bolivia, donde fue citada para casi todos los deptos. (Remsen y Traylor 1989, Arribas y Jammes 1993).

Tersina viridis

El 12 ago 1993, A. G. Di Giacomo observó un macho, en la desembocadura del arroyo Santelmita en el río Lipeo, PN Baritú.

La especie habita Misiones (Olrog 1979), y ha sido registrada varias veces en Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo 1993), y una vez en La Pampa (Darrieu 1994), no siendo conocida hasta el momento su presencia en el NOA, donde no debería resultar extraña, si se tienen en cuenta los hábitos erráticos y migratorios ya comentados por diversos autores (Ridgely y Tudor 1989, Canevari *et al.* 1991).

Chlorophonia cyanea

Los autores recopilaron dos registros de esta especie para el PN Calilegua. O. Moreno (com. pers.), halló una pareja en cercanías de Aguas Negras, entre fines de junio y principios de julio de 1992. Por su parte R. Hearn (*in litt.*), observó la especie en Mesada de las Colmenas (1150 msnm), el 30 set 1993.

En nuestro país la forma *C. c. cyanea*, habita Misiones (Olrog 1979) y NE de Corrientes (Contreras 1987). Los hallazgos del NOA pueden corresponder a la subespecie *C. c. longipennis*, pero hasta tanto los mismos no puedan ser referidos con material no es posible conocer a cuál subespecie pertenecen. *C. c. longipennis*, se distribuye a través de los Andes, desde el W de Venezuela y E de Colombia hasta Bolivia (Paynter 1970, Fjeldsa y Krabbe 1990), donde ha sido señalada para los deptos. de El Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca (Remsen y Traylor 1989).

AGRADECIMIENTOS

A. A. Bosso, P. Cichero, J. C. Chebez, D. Gallegos, G. Gil, S. Heinonen Fortabat, D. Jakúlica y S. Krapovickas, que posibilitaron a los autores trabajar en los relevamientos ornitológicos de los PN Calilegua y Baritú. A. J. Baldo, F. Dobrotinich, A. Giraudo, N. Hilgert, G. Marino, F. y A. Quiroga, H. Ruoco y M. Tassinari, que también participaron en las distintas campañas. A los observadores citados en el texto, que gentilmente cedieron sus datos para ser incluidos en la nota. A los revisores de la misma por sus sugerencias, y a J. R. Contreras por sus aportes bibliográficos.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Arribas, M. A. y L. Jammes. 1993. Lista de las Aves de Bolivia. Fund. Armonía, Santa Cruz de la Sierra.
- Bond, J. y R. Meyer de Schauensee. 1942. The Birds of Bolivia. Part I. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 94: 307-391.
- Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomo I y II. Fund. Acindar, B. Aires.
- Contreras, J. R. 1987. Lista preliminar de la avifauna correntina. II. Passeriformes. Hist. Nat. 7: 61-70.
- Chebez, J. C. 1992. Notas sobre algunas aves poco conocidas o amenazadas de Misiones (Argentina). Aprona, Bol. Cient. 21: 12-30.
- Chebez, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Ed. Albatros, B. Aires.
- Dabbene, R. 1926. Aves nuevas y otras poco comunes para la Argentina. Hornero 3: 390-396.
- Darrieu, C. A. 1994. Dos nuevos registros para la avifauna pampeana: *Tersina viridis viridis* (Emberizidae: Thraupinae) y *Columbina talpacoti talpacoti* (Columbidae). Neotrópica 40: 56.
- de Lucca, E. R. 1992. Rapaces Amenazadas. Las águilas del género *Spizaetus* en la Argentina. Estado de conocimiento actual. Nuestras Aves 27: 20-22.
- Fjeldsa, J. y N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes. Zool. Mus. Univ. Copenhagen y Apollo Books, Svendborg.
- Hellmayr, C. E. y B. Conover. 1949. Catalogue of Birds of the Americas and the Adjacent Islands. Field. Mus. Nat. Hist. Zool. Ser 13, Part 1 (4): 1-358.
- Hoy, G., F. Contino y E. R. Blake. 1963. Addendas a la avifauna argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba 43: 295-308.
- Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. Asoc. Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., B. Aires.
- Navas, J. R. y N. A. Bó. 1991. Aves nuevas o poco conocidas de Misiones, Argentina. IV. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool. 15: 95-106.
- Nores, M. y D. Yzurieta. 1983. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte IV. Hist. Nat. 3: 41-43.
- Olrog, C. C. 1959. Las aves argentinas. Una Guía de campo. Inst. Miguel Lillo, Tucumán.
- Olrog, C. C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Op. Lilloana 9: 1-377.
- Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.
- Olrog, C. C. 1985. Status of Forest Raptors in Northern Argentina. ICBP Technical Publication No. 5: 191-197.
- Paynter, R. A. Jr. (ed.). 1970. Check-List of Birds of the World. Vol. 13. Mus. Comp. Zool. Cambridge, Massachusetts.
- Remsen, J. V., Jr. y M. A. Traylor, Jr. 1989. An annotated list of the birds of Bolivia. Buteo Books, Vermilion.
- Remsen, J. V., Jr., M. A. Traylor, Jr. y K. C. Parkes. 1986. Range extensions for some Bolivian birds, 2. (Columbidae to Rhinocryptidae). Bull. B.O.C. 106: 22-32.
- Ridgely, R. S. y G. Tudor. 1989. The Birds of South America. Vol. 1. The Oscine Passerines. Univ. Texas Press, Austin.