

NOTAS NIDOLÓGICAS SOBRE AVES ARGENTINAS*

MARTIN RODOLFO DE LA PEÑA **

INTRODUCCION

Se describen los hallazgos de nidos conocidos de nuestra avifauna. Los datos corresponden a *Herpetotheres cachinnans cachinnans*, *Cinclodes fuscus albiventris*, *Cinclodes atacamensis* y *Troglodytes modesta modesta*.

Se especifican las características del nido, materiales de construcción, lugar, fecha, número de huevos, color y medidas de los mismos.

ESPECIES

HALCON GUAICURU

Herpetotheres cachinnans cachinnans (Linne).

Nidificación.

El día 2-1-1978 en Tartagal (Santa Fe) se encontró un nido en un árbol, construido en un hueco de una rama rota, a 3 metros del suelo.

Los huevos depositados directamente sobre un poco de tierra que contenía el hueco.

Tenía 2 huevos incubados que medían 59 x 46 y 58 x 47 mm.

Color de los huevos

Ocre oscuro con grandes manchas marrón rojizas oscuras. En uno de los huevos en mayor cantidad hacia el polo mayor.

El día 13-1-78 en el mismo lugar y en el mismo hueco había otra postura de 2 huevos sin incubar que medían 60 x 47 y 57,5 x 47 mm.

Uno de estos huevos es de color ocre con grandes manchas marrón oscuro y rojizas y el otro marrón rojizo con manchas más oscuras.

REMOLINERA COMUN

Cinclodes fuscus albiventris (Philippi y Landbeck)

Nidificación

El día 29-11-1978 en Cachipampa (Salta) se halló un nido a 2,50 metros del suelo, en la ladera de una montaña, en un hueco construido en la tierra.

Medidas de la cueva: 35 cm de largo. Boca de 8 cm de diámetro.

En la cámara de postura había una taza de pajitas finas externamente e internamente cercadas y pocas lanas, de 8-10 cm de diámetro.

Tenía 2 huevos con principio de incubación, que medían 24 x 20 y 24,1 x 19,8 mm.

*Comunicación presentada en el 1er. Encuentro Iberoamericano de Ornitología y Mundial sobre Ecología y Comportamiento de las Aves (1er. Congreso Iberoamericano de Ornitología) Buenos Aires, 25-XI al 1-XII de 1979.

** Investigador independiente, Simón de Iriondo 3218, 3080 Esperanza, Santa Fe, Argentina.

Color

Blanco.

REMOLINERA CASTAÑA*Cinclodes atacamensis atacamensis* (Philippi)**Nidificación**

El día 30-11-1978 en Cachipampa (Salta) se halló un nido construido en un hueco en una barranca de tierra a 4 metros del suelo y a 50 cm del borde superior de la misma.

Medidas de la cueva: 8-10 cm de diámetro y 1 metro de profundidad.

La cámara un poco más amplia, con un platito de pastos (gramillas) secas de 10 cm de diámetro.

Tenía 2 huevos con principio de incubación que medían 26,2 x 19,5 y 27,5 x 19,1 mm.

Color

Blanco.

CANASTERO PALIDO*Thripophaga modesta modesta* (Eyton).**Nidificación**

El día 30-11-1978 se halló un nido en Cachipampa (Salta) construido en un hueco en la ladera de la montafia a unos 3 metros del suelo

El hueco medía: 78 cm de diámetro y unos 40 cm de profundidad, ligeramente curvo. La cámara de postura de unos 12-15 cm de diámetro, de forma redondeada y completamente forrada con pastos y bien acolchada con pelusas vegetales, lanas, pelos y plumas.

El 22-2-1979 en Abra Pampa (Jujuy) otro nido en la base de un arbusto sobre una barranca de 50 cm de alto, muy bien disimulado entre las raíces de la planta.

Forma esférica, construido con pajas y plumas. Tenía dos pichones.

Color

Blanco.

SUMMARY: Notes on nesting of Argentine birds.

Data on little-known nests of argentinian birds are presented: *Herpetoheres cachinnans cachinnans*, *Cinclodes fuscus albiventris*, *Cinclodes atacamensis atacamensis* and *Tripophaga modesta modesta*.

Places, dates, nest sites and materials, clutch size and egg measurements are given.



Foto Nº 1: Nido de *Herpetotheres cachinnans cachinnans* construido en un hueco de una rama.




Foto Nº 2: Nido de *Cinclodes fuscus albiventris*.




Foto Nº 3: Nido de *Cinclodes atacamensis atacamensis*.




Foto Nº 4: Nido de *Thripophaga modesta modesta* construido en un hueco