

Sobre la presencia del Loro Barranquero (*Cyanoliseus patagonus*) en el Uruguay

Enrique H. Bucher * y Ethel N. Rodriguez **

ABSTRACT.— On the presence of the Patagonian Conure (*Cyanoliseus patagonus*) in Uruguay.

The presence of the Patagonian Conure in Uruguay has been up to now considered as doubtful because of the lack of valid references. We give details of two records which confirm the occurrence of this parrot in SW Uruguay coastal area as a rare and sporadic winter visitor. *Aceptado el 26 de febrero de 1986.*

La presencia del loro barranquero en el Uruguay ha sido hasta el presente considerada como dudosa (Forshaw 1973). Tremoleras (1920) la incluye por primera vez en una lista de las aves uruguayas, mencionándola para el departamento San José. Cuello y Gerzenstein (1962) citan la referencia de Tremoleras, pero estiman que puede ser incorrecta, considerando que en el Uruguay la gente de campo llama "loro barranquero" a varias especies de sitácidos. Gore y Gepp (1978) también lo listan como "un raro visitante invernal en los departamentos occidentales", sin aportar nuevos elementos de juicio. Estos autores refieren que en 1972 hubo varios ejemplares a la venta en el mercado dominical de Tristán Narvaja en Montevideo, y a pesar de que se les informó que habían sido atrapados en el departamento Soriano, consideran que es más probable que provinieran de Argentina.

En una recorrida por el Uruguay realizada en 1984, hemos obtenido evidencias sobre la presencia de la especie en el país, las que a continuación se detallan:

Visitamos al Sr. Nilo Calero, domiciliado en su establecimiento rural a siete kilómetros al oeste de la localidad de Juan Lacaze, en el departamento Colonia, quien tenía dos ejemplares de *Cyanoliseus patagonus patagonus* enjaulados. Nos informó que uno de ellos había sido cazado en el invierno de 1981, cuando merodeaba en las cercanías. El segundo había llegado a los alrededores de la residencia en el invierno de 1983, atraído por la presencia del primer ejemplar, donde fue capturado. El Sr. Calero nos informó que esporádicamente se ven ejemplares que llegan hacia fines de abril, y que prefieren los sembrados de maíz donde los pobladores suelen cazarlos.

En el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo encontramos depositados dos ejemplares de esta especie. El primero lleva el número de catálogo 04113, sin localidad de colección especificada, llevando como referencia "R.O.U., F. Masonis, 1902". Se trata de un ejemplar adulto de *C.p. patagonus*, sexo sin determinar. Tiene las plumas de las alas cortadas, lo que hace presumir que se trata de un ejemplar de jaula. Por todo ello, lo consideramos sin valor para nuestro análisis.

El segundo (número 04664) fue coleccionado por Ricardo Praderi en el Arroyo Lime-tas, departamento Colonia, el 29 de junio de 1977. Se trata de un ejemplar juvenil (reconocido por la coloración blanquecina del pico) de *C.p. patagonus*, sin determinación de sexo. Visitamos al Ing. R. Praderi en su establecimiento de campo cercano a la localidad de Conchillas, por el que pasa el Arroyo Limetas, quien nos informó que el espécimen enviado al Museo era un ejemplar solitario que merodeaba en los alrededores del arroyo. Nos comentó además que en veinte años de residencia en el lugar había tenido oportuni-

Nota del Editor: Durante la preparación del presente número de El Hornero, apareció una publicación en la cual se hace referencia al ejemplar N° 04664 citado en este trabajo (Cuello, J. P. 1985. Lista de referencia y bibliografía de las aves uruguayas. Serie Divulg. N° 1. Mus. Damaso Larrañaga, Montevideo).

dad de ver otros, pero que en general consideraba la presencia del loro barranquero en la región como un evento muy raro.

Es de destacar que el Arroyo Limetas tiene en el lugar barrancas de entre tres a cuatro metros de altura. Asimismo, el Río Uruguay tiene barrancas de igual altura en la costa uruguaya a partir de la desembocadura del Río San Juan, y en el Río de la Plata hay barrancas de igual o mayor altura hasta poco antes de la desembocadura del Río Santa Lucía.

Puede atribuirse la presencia de estos migrantes ocasionales a un movimiento de dispersión (el ejemplar coleccionado era un juvenil) o una migración parcial vinculada al desplazamiento hacia el norte que durante el otoño llevan a cabo las poblaciones del sur de la provincia de Buenos Aires y Patagonia, y que durante el siglo pasado eran mucho más marcados (Hudson 1920). Es posible que condiciones climáticas excepcionales (como vientos fuertes y persistentes del sur) favorezcan la llegada de ejemplares aislados que serían atraídos por los ríos con barrancas de la región, los que proporcionan el tipo de hábitat preferido por esta especie.

Consideramos, en conclusión, que las evidencias aquí presentadas permiten confirmar la presencia del loro barranquero en el Uruguay, como un raro y esporádico visitante invernal en el suroeste del país.

Nuestro reconocimiento al Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Uruguay, Lic. M. Klappenbach, por facilitarnos la revisión del material depositado, y al Ing. Agr. Jorge Bernabe por proveernos información sobre los ejemplares de loros capturados en Juan Lacaze.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Cuello, H. & E. Gerzenstein. 1962. Las aves del Uruguay. Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Montevideo 6: 1 - 191.
Forshaw, J. M. 1978. Parrots of the world. 2ª ed. Landsowne, Melbourne.
Gore, M. E. & A. R. Gepp. 1978. Las aves del Uruguay. Mosca Hnos., Montevideo.
Hudson, W. H. 1920. Birds of La Plata. Vol. 2. Dutton & Co., New York.
Tremoleras, J. 1920. Lista de las aves uruguayas. Hornero 2: 10 - 25.

* *Centro de Zoología Aplicada. Universidad Nac. de Córdoba. Casilla de Correo 122. 5000 Córdoba, Argentina.*

** *Ministerio de Agricultura y Pesca. Dirección de Sanidad Vegetal. Av. Millan 4703. Montevideo, Uruguay.*

Nuevos Registros para Aves de Argentina

Manuel Nores*

ABSTRACT.- New records for Argentine birds.

New data on the geographic distribution of 14 species and subspecies of Argentine birds are given. The existent records for neighbouring areas, are also given.

En esta comunicación se amplía la distribución conocida en Argentina de 14 especies y subespecies de aves. Las mismas son el resultado de revisiones realizadas en las colecciones de la Fundación Miguel Lillo, de Tucumán (FML) y del Instituto Argentino de Investiga-