

REGISTROS NUEVOS O INFRECUENTES DE AVES ARGENTINAS *

SAMUEL NAROSKY **

ABSTRACT: New locations are reported, thus extending the distributions areas for 46 species in the Argentine Republic.

INTRODUCCION

Al revisar las notas de campo de los últimos catorce años (1967-80), se halló información de interés científico acerca de localidades nuevas o poco citadas para muchas especies de la avifauna argentina. No se ha coleccionado material, aunque existen pruebas fotográficas en la mayoría de los casos. Prácticamente todas las observaciones fechadas hasta enero de 1973 han sido obtenidas en observaciones conjuntas con Darío Yzurieta.

Los datos de distribución fueron cotejados con otros autores, pero pertenecen fundamentalmente a la Nueva Lista de la Avifauna Argentina (Olrog, 1979), cuya información está citada en el texto como "distribución conocida" y la refrimos solo a la República Argentina.

Nothoprocta cinerascens. Inambú Montaraz.

Médanos (Bs. Aires). 19-X-74. Dos ejemplares en un monte xerófilo. Zapata (1972:184), la menciona aproximadamente para la misma localidad.

Tachybates dominicus. Macá Chico.

Virasoro (Corrientes), 18-XI-75 y Puerto Iguazú (Misiones), 10-XI-79, parejas. La presencia de esta especie en época de reproducción en dichas localidades, hace suponer que su área de cría es mucho mayor que la conocida de Salta, Jujuy y Tucumán.

Tigrisoma lineatum. Hocó Colorado.

Especie escasa pero residente en los montes de la costa del Río de la Plata. Punta Lara (Bs. Aires), 25-V-78 y 4-II-79; Berisso (Bs. Aires), 20-VI-79; junto a R. L. Carman, Magdalena (Bs. Aires), 12-IX-80. J. Klimaitis (com. pers.) y Ch. Henschke (com. pers.), lo ven habitualmente en la zona ribereña. R. Fraga (com. pers.), halló 3 o 4 individuos solitarios en Punta Lara, 13-V-79.

Distribución conocida: ocasionalmente llega hasta Buenos Aires.

Cathartes burrovianus. Jote Cabeza Amarilla.

Río Guayquirararé (Corrientes), 10-II-75, por lo menos una pareja a 60 metros de la frontera con Entre Ríos, provincia donde todavía no fue citado.

Buteogallus urubitinga. Aguila Negra.

Junto a J. Klimaitis, Berisso (Bs. Aires), 8-I-78, dos subadultos juntos. Fue incluída para Buenos Aires por Narosky (1978). Distribución meridional conocida: hasta Santa Fe.

Elanus leucurus. Milano Blanco.

Parece tratarse de una especie en expansión. Narosky (1978), lo cita hasta Río Negro. Fue observado sobre la ruta 3, km 1015, entre Viedma y San Antonio Oeste, ambas localidades de Río Negro. Nores (com. pers.), lo halló en Gaiman (Chubut). J. Daciuk (1977), cita la captura de un macho en la localidad de Lago Puelo (Chubut), 3-VIII-61. Distribución meridional conocida: hasta Buenos Aires.

Pandion haliaetus. Sangual.

Junto a J. Klimaitis, Berisso (Bs. Aires), 3-IV-77, un ejemplar volando sobre el río de la Plata cerca de la costa. Primer registro para Buenos Aires y el más austral en la Argentina. Distribución meridional conocida: hasta Tucumán. Nores e Yzurieta (com.

* Recibido para su publicación: 20-XI-1981.

** Investigador y observador de aves independiente. Av. H. Yrigoyen 4200 (1824) Lanús, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

ISSN 0073-3407	EL HORNERO	Buenos Aires	v. XII	n. 2	pág. 122-126	diciembre 1983
-------------------	---------------	-----------------	--------	------	-----------------	-------------------

pers.), observaron posteriormente ejemplares en Concordia (Entre Ríos), y Córdoba, VII-1978.

Aramus guarauna. Carau.

Mayor Buratovich (Bs. Aires), 12-IV-72, un ejemplar muerto en la ruta. Distribución meridional conocida; hasta el Norte de Buenos Aires.

Jacana jacana. Jacana.

Azul (Buenos Aires), 18-XI-67, 7-XII-71 y 1-XI-76; Maipú (Bs. Aires), 23-X-78. La presencia de adultos en época de reproducción presupone que cría en las localidades citadas. Distribución meridional conocida: hasta el norte de la provincia de Buenos Aires.

Actitis macularia. Playerito Manchado.

Lago Puelo (Chubut), 29-I-77, un ejemplar. La cercanía del océano Pacífico hace suponer que la especie llegue desde Chile, donde ha sido registrado tan al Sur como en el lago de Todos los Santos, en la provincia de Llanquihue, Johnson (1965). Es ésta la cita más meridional para la especie, cuya distribución conocida alcanza desde el hemisferio norte hasta Misiones, Tucumán y Este de Buenos Aires.

Chionis alba. Chorlote.

San Clemente del Tuyú (Bs. Aires), 26-V-70 y 22-IV-73. Ejemplares aislados suelen observarse en las cercanías de Cabo San Antonio, extremo meridional de la ensenada de Samborombón.

Distribución septentrional conocida: hasta Mar del Plata.

Columbina talpacoti. Palomita castaña.

Punta Lara (Bs. Aires), 12-IV-70, dos ejemplares junto a una bandada de *Columbina picui*. Accidental en Buenos Aires, según la distribución conocida. Solo fue hallada una cita anterior en Pereyra (1938).

Anthracothonax nigricollis. Picaflor Vientre Negro.

Junto a M. Nores, D. Yzurieta y J. Klimaitis, Bouvier (Formosa), 21-II-74. El picaflor más abundante en la zona. Distribución conocida: Misiones y Corrientes.

Leucochloris albicollis. Picaflor Garganta Blanca.

Mar del Plata (Bs. Aires), 28-II-77, 15-I-79 y 24-I-81. Muy común en la zona. Fue hallado en el mismo sitio en diferentes años. Al parecer en franca expansión. Hay citas actuales diversas para la zona ribereña del Plata: Ch. Henschke (com. pers.), R. Fraga (com. pers.). En compañía de J. Klimaitis fue observado en pleno invierno en el Delta bonaerense, 20-VI-78. El primer registro pertenece a Pereyra (1965), en Zelaya, a fines de noviembre. Distribución meridional conocida: hasta el Este de Buenos Aires.

Asthenes patagonica. Canastero Patagónico.

Cardenal Cagliero (Bs. Aires), 10-IV-72; Carmen de Patagones (Bs. Aires), 16-XI-72 y 17-X-74. Especie común en el Sur de la provincia, donde su nido fue hallado en 2 oportunidades, uno de ellos parasitado por *Molothrus bonariensis*.

Coryphistera alaudina. Crestudo.

Médanos (Bs. Aires), 31-XII-71 y 7-II-77; Bahía Blanca (Bs. Aires), 13-XII-72. Especie, que como la siguiente, sigue la provincia del Espinal. En 2 de las citas fue hallado el nido. Aunque la distribución meridional conocida alcanza La Pampa y Mendoza, en Narosky (1978), ya se incluye para el S.O. de Buenos Aires.

Pseudoseisura lophotes. Cacholote.

Médanos (Bs. Aires), 19-I-72, 12-IV-72 y 7-II-77; Carmen de Patagones (Bs. Aires), 11-IV-72, 15-XII-72 y 8-X-74. Especie común en el Sur-Sudoeste de Buenos Aires, donde convive con *P. gutturalis*. Aunque la distribución meridional conocida alcanza Mendoza, La Pampa y Río Negro, Narosky (1978), ya la incluye para el Sur-Sudoeste de Buenos Aires.

Thamnophilus caerulescens. Batará Plomizo.

Junto a J. Klimaitis, Lima (Bs. Aires), 26-V-73; río Paraná de las Palmas, Delta bonaerense, 20-VI-78. Varios ejemplares en el monte. Aunque la distribución meridional

conocida alcanza Entre Ríos, ya Pereyra (1938), de acuerdo a Holmberg, lo incluye para Buenos Aires y Narosky (1978), para el Nordeste de esta provincia.

Myrmorchilus strigilatus. Batará Estriado.

Tres isletas (Chaco), 16-V-76, varios ejemplares en el monte. Distribución conocida: Jujuy, Salta y Formosa.

Agriornis murina. Gaucho Chico.

Médanos (Bs. Aires), 12-IV-72; Emilio Lamarca (Bs. Aires), 13-XII-72; Carmen de Patagones (Bs. Aires), 15-XII-72, adultos alimentando un joven. Al parecer nidifica en el Sur de la provincia. Área de cría conocida: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Gubernetes yetapa. Yetapá Grande.

Carlos Pellegrini (Corrientes), 15-VI-77, dos ejemplares sobre un alambrado en campo abierto.

Satrapa icterophrys. Amarillo.

San Clemente del Tuyú (Bs. Aires), 30-III-71 y 10-XI-79, ejemplares aislados. Son nuestros registros más meridionales para esta especie.

Tyrannys tyrannus. Pitirre Migratorio.

Puerto Iguazú (Misiones), 10-II-75. Abundante. En bandadas. Su distribución conocida alcanza el sur de Formosa, Jujuy y Tucumán, aunque König (1979), lo cita para Misiones por un ejemplar visto en la zona de Cataratas.

Conopias trivirgata. Benteveo Chico.

Virasoro (Corrientes), un individuo en la selva sobre el río Uruguay. Distribución conocida para la Argentina: Misiones.

Phylloscartes ventralis. Mosqueta Vientre Amarillo.

Junto a J. Klimaitis, Lima (Bs. Aires), 26-V-73, en las barrancas del río Paraná. Fue incluida por Narosky (1978), para el Nordeste de Buenos Aires. Distribución Meridional conocida: hasta Entre Ríos:

Euscarthmus meloryphus. Mosqueta Parda.

San Nicolás (Bs. Aires), 21-I-73, en las barrancas del río Paraná. Especie incluida en Narosky (1978), para el Nordeste de Buenos Aires. Distribución meridional conocida: hasta Córdoba y Entre Ríos.

Anairetes parulus. Cachudito Pico Negro.

Carmen de Patagones (Bs. Aires), 11-XII-72. Bastante común en época de reproducción. Especie incluida por Narosky (1978), para el Sur de Buenos Aires. Distribución conocida: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La subespecie *A.p. patagonicus* migra en otoño hasta Tucumán y Salta.

Stygmatura budytoides. Calandrita.

Cardenal Cagliero (Bs. Aires), 28-I-71, un adulto con un joven que lo seguía, y 10-IV-72, pareja cantando a dúo; Pedro Luro (Bs. Aires, 8-IV-72, canto a dúo; Carmen de Patagones (Bs. Aires), 11-IV-72, parejas; Médanos (Bs. Aires), 12-IVA-72, parejas; Emilio Lamarca (Bs. Aires), 13-XII-72, parejas. Carmen de Patagones (Bs. Aires), 19-X-74, adulto seguido por dos jóvenes apenas voladores. Especie abundante durante todo el año en el Sur de la provincia de donde consideramos improbable que migre. No conocemos citas para localidades del centro y Norte de Buenos Aires. Especie incluida por Narosky (1978), para el Sur y Sudoeste de Buenos Aires.

Distribución conocida para *S.b. flavocinerea*: La Pampa, Mendoza y Río Negro, migrando hacia el norte en otoño.

Elaenia spectabilis. Fiofío Copetón.

Baradero (Bs. Aires), 21-I-73, una pareja en las barrancas del río Paraná. J. Klimaitis (1977), cita *E. flavogaster* para Berisso (Bs. Aires), refiriéndose seguramente a *E. f. spectabilis*, ahora separada como especie distinta. Incluida por Narosky (1978), para el Nordeste de Buenos Aires. Distribución meridional conocida: Norte de Santa Fe y Corrientes.

Riparia riparia. Golondrina Parda Chica.

Palmar de Colón (Entre Ríos), 25-XII-70), sobre el río Paraná fueron repetidamente observados ejemplares de esta golondrina. Se supone primera mención para la provincia de Entre Ríos y el registro más austral conocido.

Tachycineta leucopyga. Golondrina Patagónica.

Carmen de Patagones (Bs. Aires), 15-XII-72, una pareja nidificando en un hueco de carpintero, en un sauce (*Salix*). Distribución conocida: Neuquén y Río Negro hasta Tierra del Fuego, migrando en otoño hacia el norte.

Donacobius atricapillus. Angú.

Junto a M. Nores, D. Yzurieta y J. Klimaitis, Bouvier (Formosa), 20-II-74. Entre un grupo de pehuajos (*Thalia*), varios ejemplares. Olrog (1979), cita *D.a. albobittatus* para el Este del Chaco y como probable para el Este de Formosa.

Turdus falklandii. Zorzal Patagónico.

Mayor Buratovich (Bs. Aires), 8-IV-72; Carmen de Patagones (Bs. Aires), 11-IV-72 y 15-XII-72. Nidifica en la zona. Narosky (1978), lo cita para el Sur de Buenos Aires. Distribución conocida: Neuquén y Río Negro, hasta Tierra del Fuego.

Anthus hellmayri. Cachirila Pálida.

San Vicente (Bs. Aires), 5-XII-70, 16-XII-70, 2-I-71 y 17-VIII-79; San Clemente del Tuyú (Bs. Aires), 10-XI-79. Especie común, aunque confundible con otras. En una ocasión alimentando a un joven. Narosky (1978), lo cita desde el Norte hasta Chubut. La distribución conocida de *A.h. hellmayri* alcanza hacia el Sur La Rioja y Tucumán desplazándose en invierno hacia las llanuras. *A.h. dabbeni* se encuentra desde Neuquén y Río Negro hasta Santa Cruz migrando en otoño hacia el Norte.

Anthus bogotensis. Cachirila Andina.

Abra Pampa (Jujuy), 25-II-76, dos ejemplares cerca de la laguna Runtuyoc. Distribución conocida: Tucumán y Catamarca. Probablemente también, Salta y Jujuy.

Thlypopsis sordida. Fruterito Cabeza Dorada.

Junto a J. Klimaitis, río Paraná de las Palmas, Delta bonaerense, 20-V-78, un ejemplar en el monte. Distribución meridional conocida: Tucumán, Norte de Santa Fe y Corrientes.

Sporophila palustri. Capuchino Pecho Blanco.

Carlos Pellegrini (Corrientes), 28-XI-76, un macho adulto asentado sobre una mata, al borde de la ruta 41, alimentaba a un joven. Distribución conocida: Entre Ríos.

Diuca diuca. Diuca Común.

Pedro Luro (Bs. Aires), 7-I-71; Cardenal Cagliero (Bs. Aires), 28-I-71; San Blas (Bs. Aires), 8-IV-72; Médanos (Bs. Aires), 12-IV-72; Emilio Lamarca (Bs. Aires), 13-XII-72; con nido; Cardenal Cagliero, 14-XII-72, con nido; Carmen de Patagones (Bs. Aires), 17-XII-72, dos nidos; 17-X-74, dos nidos. Especie abundante y que nidifica en profusión en el Sur de la provincia. Short (1967), lo halló también nidificando y Narosky (1978), lo cita como residente en esa zona. Según la distribución conocida de *D.d. minor* a quien deben atribuirse esos hallazgos, cría desde Río Negro hasta Santa Cruz migrando hacia el Norte en invierno.

Phrygilus fruticeti. Frigilo Negro Grande.

Carmen de Patagones (Bs. Aires), 15-XII-72, en despliegue nupcial; 8-X-74 con nido. El 22-IX-79, fue hallada una hembra o joven en Magdalena (Bs. Aires). Narosky (1978) lo cita como residente en el Sur de Buenos Aires. Distribución conocida: desde Jujuy hasta Mendoza y desde Neuquén y Río Negro hasta Santa Cruz.

Molothrus badius. Músico.

Junto a J. Daciuk, Puerto Madryn (Chubut), 23-I-71, dos ejemplares en arboleda exótica. Daciuk (1979), lo cita para Puerto Madryn, Trelew y Rawson (alrededores). Bariloche (Río Negro), 12-I-72, varios junto a *Curaeus curaeus*. Narosky (1978), lo cita hasta Chubut. Distribución meridional conocida: hasta Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.

Pseudoleistes virescens. Dragón.

Pedro Luro (Bs. Aires), 8-IV-72, bandadas. Distribución meridional conocida: hasta Santa Fe y Sudeste de Buenos Aires.

Sicalis lutea. Jilguero Puna.

Cafayate (Salta), 27-VII-72, y Tafí del Valle (Tucumán), 28-VII-72, acompañado por F. Contino, a más de 2.000 metros de altura. Convive con *S. olivascens*. El 22-II-73, se lo halló nidificando en Humahuaca (Jujuy). Hasta ahora sólo conocido del altiplano jujeño.

AGRADECIMIENTO

A Rosendo Fraga por la lectura y sugerencias respecto de este manuscrito y a la Srta. Sara Celis por su colaboración.

BIBLIOGRAFIA

- DACIUK, J., 1977. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica surcordillerana (Subregión Araucana, Prov. de Río Negro y Chubut, Argentina). *Physis*, Sec. C, 36(92):201-213, Buenos Aires.
- 1979. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXII. Elenco sistemático de las aves colectadas y observadas en la Península Valdés y litoral marítimo de Chubut (República Argentina). *Acta Zool. Lilloana*, XXXV:643-666, Tucumán.
- EL HORNERO, 1917-1977. *Rev. Asoc. Orn. del Plata*, Vol. I a XI, Buenos Aires.
- JOHNSON, A. W., 1965. *The Birds of Chile and Adjacent Regions of Argentina, Bolivia and Perú*, Vol. I, Platt Est. Graf., Buenos Aires.
- KLIMAITIS, J., 1977. De mi libreta de apuntes. *El Hornero*, XI (5):417.
- KONIG, C., 1979. Presencia de *Tyrannus tyrannus* en Misiones. *El Hornero*, XII (4):55-56.
- NAROSKY, S., 1978. Aves Argentinas, Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense, Asoc. Orn. del Plata, Buenos Aires.
- OLROG, C. C., 1959. Las Aves Argentinas, Una Guía de Campo, Ins. M. Lillo, Tucumán.
- 1968. Las Aves Sudamericanas, Una Guía de Campo. Tomo I, Ins. M. Lillo, Tucumán.
- 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. Op. Lilloana N° 27, Tucumán.
- PEREYRA, J. A., 1937. Aves de La Pampa. *Mem. Jard. Zool. La Plata*: 7:197-326.
- 1938. Aves de la Zona Ribereña Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, *Mem. Jard. Zool. La Plata* 9:1-304.
- 1965. *Leucochloris albicollis* en la Provincia de Buenos Aires, *El Hornero*, X (3):279.
- SHORT JR., L. L., 1967. Some usual Birds of Southern Buenos Aires Province. *El Hornero*, X (4):459-460.
- 1971. Aves nuevas o poco comunes de Corrientes. Buenos Aires. *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Zool.*, 9 (11).
- STEULLET, A. B. Y E. A. DEAUTIER, 1935-46. Catálogo sistemático de las aves de la República Argentina, Univ. Nac. de La Plata.
- ZAPATA, A. R. R. Y H. S. MARTINEZ, 1972. Algunas aves no citadas y otras poco frecuentes para el sur de la provincia de Buenos Aires. *Act. Zool. Lilloana*, N° 29, pp, Tucumán.