

NOTAS VARIAS

CONFIRMACIÓN DE UNA NUEVA COLONIA DE NIDIFICACIÓN DEL PINGÜINO DE MAGALLANES (*Spheniscus magellanicus*)

El señor Pablo Korschenewski, de Puerto Madryn, nos informa del hallazgo de una pingüinera de reciente data en las proximidades de punta Cero, de la caleta Valdés, Chubut (Fig. 1). Estima su población actual en alrededor de cien parejas. La mayoría de los nidos fueron hallados debajo de las matas aisladas que crecen en ese lugar y que se encontraron en la parte más elevada de la caleta (*).




Figura 1.

- * (N R) Para una ampliación de los datos expuestos ver: Daciuk J., 1976. Estudio bioecológico inicial de los Esfenicidos visitantes y colonizadores de Península Valdés y costas aledañas. Physis, Sec. C, 35 (90): 43-56.

PRESENCIA DEL CHORLITO ENANO, *Calidris pusilla*, EN LA ARGENTINA

Por S. NAROSKY, D. YZURIETA y M. NORES

El río Segundo, uno de los tres que alimentan la laguna Mar Chiquita, forma en ocasiones, en su desembocadura, una amplia zona de riachos y bañados. Este sector palustre, constituido por una mezcla del agua dulce del río y de la extremadamente salada de la laguna, está en gran parte arbolado con tamariscos, resultando apropiado para diversas especies de aves acuáticas que se concentran en enormes cantidades. Cuando el nivel de la laguna es bajo, el río no desborda, desaparecen los bañados y quedan pocos ejemplares dispersos en las playas de la laguna.

A fines de 1974, mientras recorriamos la zona efectuando observaciones de la avifauna, pudimos reconocer, entre una bandada de *Calidris fuscicollis*, un chorlito que determinamos como *Calidris pusilla*. Le tomamos una serie de fotografías.