

## LA CALANDRIA DE TRES COLAS, *Mimus triurus* (Vieillot) EN LA ISLA VICTORIA, PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI, PROVINCIA DE NEUQUÉN

por JULIO R. CONTRERAS y VIRGILIO G. ROIG

De acuerdo con Olrog (1963:282), la distribución de la calandria de tres colas "llega hasta Río Negro", no existiendo citas documentadas para la Patagonia, con excepción de su presencia en el valle del río Collon-Cura (Contreras, 1975).

El 31 de diciembre de 1971 se obtuvo en la Estación Biológica de Puerto Radal, en la isla Victoria, departamento de Los Lagos, provincia de Neuquén, un ejemplar macho adulto de *Mimus triurus*, que está depositado en la colección ornitológica del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), con el número U-70-030.

Se extiende así en forma considerable hacia el sur la distribución conocida de esta especie, cuya presencia ocasional relativamente frecuente pudimos documentar entre 1969 y 1974 en las localidades de Paso de los Molles, Pilcaniyeu Viejo, Pampa de Huenuleo y lago Pellegrini, en la provincia de Río Negro; y en Piedra del Águila, estancia Tequel Malal, estancia Yuncón y estancia Ache-Có, en la provincia de Neuquén.

Adicionalmente merece citarse la referencia del naturalista Andrés Gai, quien la observara en la localidad de El Bolsón, al sur del departamento Bariloche de la provincia de Río Negro.

## NIDIFICACIÓN DE *Asio flammeus* EN ZONA RIBEREÑA DE LA CAPITAL FEDERAL

por PEDRO LATERRA

La observación fue efectuada en la isla N° 7 de la ciudad deportiva del club atlético Boca Juniors, que consiste en un territorio ganado al río de la Plata por medio de descargas de escombros y tierra. Las características de este lugar configuran un ambiente muy propicio para la proliferación de roedores, los cuales abundan en dicho territorio, siendo éste uno de los factores determinantes del establecimiento del lechuzón de los campos en la isla, donde existe actualmente una regular población del mismo.

Como en octubre de 1975 observé una buena cantidad de *Asio flammeus* en la isla, comencé a efectuar observaciones regulares en el mismo ambiente, y el 2 de noviembre de 1975 encontré un nido de la misma especie conteniendo 4 huevos. Siguiendo el desarrollo de la nidada observé que sólo nacieron 3 pichones, los que continuaron desarrollándose sin inconvenientes.

## NYSTALUS CHACURU

por ARTURO NAVAJAS ARTAZA

El 23 de mayo de 1975 observé una pareja de esta especie en Las Marías, Gob. Virasoro, peña de Corrientes; al principio de la observación, ambos individuos estaban posados en un hilo de teléfonos y parecían una