

# EL HORNERO

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ORNITOLÓGICA DEL PLATA

DIRECTOR : JORGE R. NAVAS

Vol. 10

Buenos Aires, Diciembre de 1967

Nº 4

## EL SURUCUÁ COMÚN

La lámina que ocupa el frontispicio del presente número de EL HORNERO, ilustra un individuo macho del Surucúa común, *Trogon surrucura surrucura* Vieillot, y fue pintada por el artista norteamericano Don R. Eckelberry, en setiembre de 1959, en la localidad de Tobunas, provincia de Misiones, sobre materiales coleccionados allí mismo por una comisión de estudios ornitológicos del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, encabezada por el señor William H. Partridge. El original de la lámina fue obsequiado por el autor al señor Partridge, quien a su vez la cedió a la Asociación Ornitológica del Plata para que se reprodujera en EL HORNERO, haciéndose cargo también de parte de los gastos de su publicación.

Esta especie comprende dos razas geográficas: una, la forma típica, habita en la Argentina, en las provincias de Misiones, norte de Corrientes, y este del Chaco y de Formosa; además se lo encuentra en el Paraguay y, en el Brasil, en los estados de Río Grande do Sul, Santa Catharina, Paraná, São Paulo, y sur de Goyaz y de Mato Grosso. La otra raza, *Trogon surrucura aurantius* Spix, vive solamente en el Brasil, en el sur de Bahía, este de Minas Geraes, Rio de Janeiro y norte de São Paulo.

Es un ave muy común en las selvas de Misiones, donde se la suele ver solitaria o en parejas, o más raramente en pequeños grupos, distribuidos en un mismo árbol. Es sumamente mansa y confiada, dejándose acercar bastante, y su voz es fuerte y sonora y algo triste, repitiéndola durante casi todo el día. Anida desde octubre a diciembre, haciendo un agujero en los troncos podridos, en donde pone tres huevos blancos inmaculados; los pichones son nidícolas y cuidados por ambos padres. Se alimentan esencialmente de insectos y otros artrópodos, pero también pueden comer pequeñas frutas, caracoles, lagartijas y ranas.

La hembra es más apagada en su coloración, no poseyendo los vivos colores y brillos metálicos del macho. Longitud total, promedio, del adulto de esta especie: 280 mm.

La familia Trogonidae, a la cual pertenece el Surucúa común, es pantropical en su dispersión geográfica, y está representada en el centro y sur de Africa, India, sudeste de Asia, Indonesia y Filipinas; en América, desde Arizona y extremo sur de Texas, por México, Centroamérica, Antillas y Sudamérica hasta el norte de la Argentina. Comprende 34 especies de las cuales 20 viven en América. — JORGE R. NAVAS.