

a los tallos verticales y horizontalizando sin embargo el cuerpo, para luego volar otra vez. Confirmando así los datos etológicos proporcionados en el trabajo de Daguerre que ya mencioné, y además los proporcionados por Darwin, el que expresa en el "Voyage of Beagle", lo siguiente: "Este pájaro vive entre los juncos de las riberas de las lagunas; a menudo se coloca verticalmente sobre los tallos de las plantas pero no usa su cola para trepar, etc."

Considero además de interés agregar la descripción de las partes desprovistas de plumas: pico córneo amarillento, con la base de la mandíbula amarillo anaranjado; iris amarillo ocre; patas córneo amarillento; uñas córneo blanquecino. — RODOLFO ESCALANTE ROSSI, *Montevideo, R. O. del Uruguay, diciembre de 1954.*

NOTAS ORNITOLÓGICAS I: PRESENCIA DEL PIQUERO PARDO EN LA ARGENTINA

El 11 de julio de 1952 llegó al Jardín Zoológico, por donación del personal del Garage Central del Arsenal Naval Buenos Aires, un ejemplar de ave marina perteneciente al género *Sula*. Había sido cazada en el río de la Plata, hasta el que al parecer habría llegado por sus propios medios; carecía de marca alguna o corte en las plumas de las alas que hiciera suponer que hubiera llegado cautiva en algún barco y que hubiera escapado de él. El estado del plumaje era relativamente bueno, físicamente se encontraba muy agotada; sólo sobrevivió tres días durante los cuales no fue posible hacerle ingerir ningún alimento.

Estudiado detenidamente el ejemplar resultó ser un individuo joven de *Sula leucogaster leucogaster* (Boddaert), conocido vulgarmente como Piquero pardo, boby común, pájaro bobo, alcatraz o "murgulhao", estos dos últimos nombres se le aplican en Brasil; también se la conoce por el nombre libresco de "brown booby".

La distribución geográfica, según Murphy (*Oceanic Birds of South America*, 2:854, 1936), es la siguiente: Atlántico pantropical, cría en Ascensión, Fernando de Noronha, Rocas Reef, Rocas de San Pablo, islas de Cabo Verde, muchos islotes lejos de la costa este de Sudamérica, y en numerosas localidades del Caribe y del golfo de México hacia el norte de las Bahamas. La especie se presenta en mares tropicales y subtropicales a través del mundo, pero distintas razas habitan islas alejadas de la costa oeste de América.

Es ésta la segunda vez que se menciona para estas latitudes (Hellmayr y Conover, *Cat. Birds Amer.*, part. I, Nº 2, p. 133, 1948) y por ello creo conveniente hacer una pequeña descripción del ejemplar en cuestión: Todo el plumaje de color castaño habano, el ápice de las plumas bordeado por un

filete más claro. La parte ventral desde la mitad del pecho hacia atrás, más claro que el resto y sus plumas también poseen el ápice más claro. Pico en la base, garganta y zonas desnudas de las mejillas, amarillo claro; las ramas del maxilar y mandíbula con tonos azulados poco definidos que degradan hacia el ápice del pico a color gris. Tarsos de color amarillento como la pata. Zonas basales de la uña del dedo medio, amarillo y algo gris en el borde dentado interno; las uñas restantes son amarillas en la base y grises en el ápice.



MEDIDAS

Longitud del culmen expuesto	101 mm
Longitud del ala plegada	423 mm
Longitud de la cola	175 mm
Longitud del tarso	39 mm
Longitud del dedo externo sin uña	67 mm
Longitud de la uña del dedo externo	11 mm
Longitud del dedo medio sin uña	68 mm
Longitud de la uña del dedo medio	14 mm
Longitud del dedo interno sin uña	50 mm
Longitud de la uña del dedo interno	10 mm
Longitud del dedo pulgar sin uña	22 mm
Longitud de la uña del dedo pulgar	8 mm

Todas las medidas fueron tomadas sobre el ejemplar embalsamado. —
 JOSÉ ANTONIO HAEDO ROSSI, *Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires,*
diciembre de 1955.