

nuevamente. Como el poder de vuelo de la perdiz colorada alcanza a lo sumo de 1000 a 1500 metros, al hacer el segundo vuelo quedan exhaustas. El foxterrier, por la seguridad de su olfato y gran resistencia, se presta admirablemente para esta forma de caza.

Recuerdo haber visto hace algunos años, a ciertos gauchos viejos con un lazo consistente en una caña de tacuara, con una armada de cuerda o en su defecto el raquis de una larga pluma de avestruz desprovista de las barbas y atada por el cañón al extremo de la caña. A esta pluma se le hace en la punta un nudo que forma un ojal por donde va pasada para hacer la armada del lazo.

Con este lazo procedían en la misma forma que con la manga, generalmente arreando una tropilla de caballos para mover las perdices, y colocándoles la armada en el cuello, para lo que se requiere mucha paciencia y buen pulso. Ya no se usa este procedimiento.

JUAN B. DAGUERRE.
Rosas, F. C. S.

CAPTURA DE UN BATITU (BARTRAMIA LONGICAUDA) EN LAS ISLAS SHETLAND DEL SUD

Nuestro consocio, el señor A. G. Bennett de Port Stanley, Falkland, en un viaje que efectuó a la isla Decepción, Shetland del Sud, a principio del corriente año, tuvo la ocasión de recoger un ejemplar de este chorlo, sobre la playa de la mencionada isla. Evidentemente se trata de un individuo extraviado en alguna isla del extremo del continente y que sorprendido por fuertes temporales ha sido arrastrado hasta el punto en donde el señor Bennett lo encontró el 8 de febrero de 1923.

También en la misma isla Decepción, nuestro consocio observó un ejemplar del petrel, *Fregetta melanogaster* (Gould), especie que ya había sido previamente encontrada por el doctor Pirie de la Expedición Escocesa, nidificando en las Orcadas del Sud.

R. D.

DOS AVES NUEVAS PARA LA FAUNA MENDOCINA

Estando ocupado actualmente en la determinación de una pequeña colección de aves recogidas en la parte occidental de la Provincia de Mendoza, he encontrado dos especies no señaladas aun en la mencionada provincia. Son las siguientes:

Habrura pectoralis minima (Gould). Un macho joven, cazado en Potrerillos, el 17 de Marzo de 1921.

Anthus furcatus furcatus Orb. et Lafr. Un macho joven, cazado en Tunuyán, el 24 de Marzo de 1921.

Ambos ejemplares han sido recogidos por el autor y ahora se encuentran en el Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard, Cambridge Mass., E. U. de América.

Estas especies no están incluidas en la lista de las aves del relieve