

en la margen derecha del río Paraná, en territorio paraguayo sea más escaso. Por otra parte, de acuerdo a lo que he observado personalmente en Misiones, esta especie parece tener una marcada predilección por ocupar un único tipo de hábitat: el sotobosque formado por los estratos inferiores de la vegetación selvática en los lugares más cubiertos y sombreados; es evidente entonces que dentro de la totalidad del área geográfica que se le asigna, su distribución estará limitada a las regiones cubiertas por esa selva propia del este-sudeste de Brasil, nordeste de Argentina (Misiones) y este de Paraguay. Puede afirmarse, entonces, que en el Paraguay, *Amaurospiza moesta* (Hartlaub) se encuentra solamente en la región del Alto Paraná.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BERTONI, A. de W. 1901. Aves nuevas del Paraguay. An. Cient. Paraguayos (1), n° 1: 1-216.
 — 1904. Contribución para el conocimiento de las aves del Paraguay. An. Cient. Paraguayos (1), n° 3: 1-10.
 — 1907. Segunda contribución a la Ornitología paraguaya. Nuevas especies paraguayas. Rev. Inst. Paraguayo: 1-12.
 — 1914. Fauna Paraguaya. Catálogos sistemáticos de los vertebrados del Paraguay. Asunción.
 — 1919. Especies de aves nuevas para el Paraguay. Hornero, 1 (4): 255-258.
 GIAL, A. G. 1951. Notas sobre la avifauna de Salta y Misiones. Hornero, 9 (3): 247-276.
 LAUBMANN, A. 1940. Die Vögel von Paraguay. Vol. 2. Wiss. Ergebn. Deutschen Gran Chaco-Expedition. Stuttgart.
 PARTRIDGE, W. H. [en prensa]. Estudio preliminar sobre una colección de aves de Misiones. Rev. Inst. Nac. Inv. C. Nat., Mus. Arg. C. Nat., C. Zool., Buenos Aires.
 ZIMMER, J. T. 1941. Studies of Peruvian Birds. N° XXXVI. The genera *Elaenia* and *Myiopagis*. Amer. Mus. Novit., N° 1108: 1-23.

WILLIAM H. PARTRIDGE, *Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, agosto de 1952.*

NUEVOS HALLAZGOS DE LA GARZA PICO CUCHARA EN LA ARGENTINA

La Garza pico cuchara, *Cochlearius cochlearius cochlearius* (Linnaeus), fué señalada por primera vez para la fauna argentina por Zotta (Hornero, 8 (2): 177, 1942), basándose en un ejemplar de Iguazú (Misiones) de la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Desde entonces, no se encuentran en la bibliografía nuevas citas de ejemplares de Argentina, pero últimamente hemos recibido para las colecciones de la Sección Ornitología del Museo dos nuevos ejemplares cazados en el país.

El primero de ellos (n° 48-253 ♀ ad.) fué obtenido por el doctor Ángel C. Umana en el kilómetro 43 (denominado Selvas del Río de Oro) de la localidad

Las Palmas, Departamento Bermejo, Provincia Pte. Perón (Chaco), el 26 de abril de 1948. Al solicitar al colector, actualmente radicado en Tucumán, estos datos, que me fueron gentilmente enviados sin reservas, el doctor Umana agrega en su carta unas observaciones que transcribo textualmente: « Fué cazado en un monte denso, tipo higrófilo chaqueño que corre a lo largo del Río de Oro formando un macizo compacto de especies arbóreas que se extiende a ambas márgenes ». Medidas: ala, 280 mm; cola, 120 mm.

El otro ejemplar (n° 52-468 ♂ ad.) lo envió desde Misiones nuestro colaborador señor Marcelino Salas, quien lo cazó el 23 de agosto de 1952 en la región del kilómetro 10 del arroyo Urugua-i en el norte del territorio. Entre los datos del rótulo del colector figura la siguiente anotación: « Por el arroyo Urugua-i ». Medidas: ala, 285 mm; cola, 122 mm. — WILLIAM H. PARTRIDGE, *Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires, diciembre de 1952.*

NOTAS SOBRE LAS ESPECIES DEL GÉNERO *FULICA* SEÑALADAS PARA LA ARGENTINA

En uno de los últimos números del Catalogue of Birds of the Americas, del Field Museum of Natural History, el n° 1, del tomo XIII, que se publicó recién en 1942 bajo la firma de Hellmayr y Conover (aunque corresponde a la primera parte de la revisión sistemática que iniciara Ch. B. Cory en 1914) aparecen importantes cambios en la nomenclatura y distribución geográfica de muchas especies.

Revisando el material de « gallaretas » del género *Fulica* conservado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales « B. Rivadavia », y de acuerdo con la citada publicación, considero que debemos señalar para la Argentina las siguientes especies:

- F. armillata* Vieillot
- F. leucoptera* Vieillot
- F. rufifrons* Philippi y Landbeck
- F. cornuta* Bonaparte
- F. americana peruviana* Morrison

Sobre las tres primeras no hay ninguna duda y disponemos de abundante material de estudio; en cuanto a las otras dos, hay en la colección solamente una pareja de cada especie, y no en muy buen estado de conservación. La falta de material ha sido la causa de que fuera clasificada una pareja procedente de Laguna Helada, Catamarca (a 3700 m), como *Fulica ardesiaca* Tschudi, en lugar de *Fulica americana peruviana* Morr., que es la forma que llega al norte de nuestro país.

Hellmayr y Conover (pág. 411) dicen que los ejemplares de Bolivia y Argentina que examinaron son más grandes y tienen el escudo frontal más exten-