

DOS AVES NUEVAS PARA EL PARAGUAY Y UNA PARA EL URUGUAY

Por ANGEL R. ZOTTA

DOS NUEVAS AVES PARA EL PARAGUAY

Pyrrhura devillei (Massena y Sauancé) y
Todirostrum cinereum coloreum (Ridgway)

La posición sistemática de muchas especies del género: *Pyrrhura* no es muy clara, en ese sentido hay bastante disparidad de criterio entre los autores que se han ocupado del grupo; además muchas especies son apenas conocidas lo cual contribuye a complicar la taxonomía del mismo. *P. devillei* es un ejemplo de lo que acabamos de decir, pocas son las referencias que de ella se tiene, y además muy poco material se ha coleccionado de esta especie.

En el Museo Argentino había dos piezas indeterminadas de *P. devillei* ambas cazadas en Puerto Guaraní el 27 de agosto de 1928 por nuestro consocio el señor J. B. Daguerre, su especificación la realizamos ahora, al ingresar otras dos más, coleccionadas en Puerto Casado, el 17 de octubre de 1944, por el señor Andrés Giai.

De la comparación de estos cuatro ejemplares, los de Puerto Casado ofrecen aparentemente características juveniles, pues la mancha ventral se halla apenas esbozadas; por lo demás, se vinculan a los de Puerto Guaraní; nuestro material no puede referirse más que a *P. devillei*, según las descripciones que figuran en el catálogo del Museo Británico, única obra de conjunto que pudimos consultar.

Viene al caso aclarar que en la clave específica de este género que da Salvadori, en la obra que consultamos, se ha deslizado una evidente errata; en la disgresión "f" se lee: "Cheeks green; Tail above and bellow olive" en lugar de decir: Cheeks green; Tail above olive, bellow coppery, brown reed", según se desprende de la descripción ahí mismo insertada.

Debemos dejar constancia que se advierte ciertas diferencias entre dicha descripción y nuestros ejemplares, éstas son: el ángulo del ala es vermellón carcaminado claro, las cobijas subalares amarillo cadmio con superposición del color anterior, en los ejemplares que consideramos jóvenes, las subalares son verdes con manchas difusas de amarillo y vermellón.

La falta de material de Bolivia, de donde procede el tipo, hace que no podamos establecer si nuestros ejemplares a pesar de las diferencias anotadas,

deban separarse subespecíficamente o si dichos caracteres dependen de la edad o de la variabilidad de la especie.

La distribución geográfica asignada a esta especie ha sido hasta hace poco Bolivia, sin especificar localidades; Peters (1) aumenta su área hasta el sur del Brasil (Matto Grosso), nosotros la ampliamos un poco más, al señalarla para el Paraguay.

De la subespecie *Todirostrum cinereum coloreum*, típica de Corumbá, Matto Grosso, en donde es relativamente común, fueron cazado dos ejemplares en Puerto Casado, también por el señor A. Giai; su presencia en el norte del Paraguay era sospechada por Laukman (2). Con dichos ejemplares ingresa a las colecciones del Museo Argentino, la representación de esta subespecie.

NUEVA ESPECIE PARA EL URUGUAY

Picumnus iheringi (Berlepsch)

El señor Ronald G. Webster Kay donó para las colecciones del Museo Argentino a fines del año 1945, un pequeño lote de aves cazadas en el Uruguay; entre esos ejemplares se halló un individuo macho de *P. iheringi* Berlepsch, capturado el 5 de abril de 1939 en La Charqueada, localidad del departamento de Treinta y Tres.

Es oportuno destacar que esta interesante especie es apenas conocida en los ambiente ornitológicos, pues según la literatura consultada, en las únicas colecciones en donde figura, son las de los Museo de Londres y Varsovia y ahora también en la del Museo Argentino.

Es curioso que el distinguido ornitólogo C. Cory, senonimizara a esta especie con *P. temmincki*, cuando publicó el volumen que trata del Orden de los Pícidos del "Catálogo de las aves de América", si bien careció de material de consulta, en la bibliografía existe un trabajo del mismo autor de esta especie que nos ocupa, en donde figura una lámina en colores en la cual se representa a ambas especies, resultando ocioso insistir sobre la imposibilidad de vincular a estos dos carpinteros enanos (3). Al respecto es oportuna la opinión de Sztoleman (4) que transcribimos "Ye ne comprends pas pour quelle raison feu Cory plaça *P. iheringi* comme synonyme du *P. temmincki* Lafresnage. Ce sont deux espèces appartenant à deux groupes différents du genre *Picumnus*".

P. iheringi es una especie estenoctona cuya dispersión geográfica se reduce al sudeste del Brasil en los estados de Río Grande del Sur y Paraná, en base a las condiciones bióticas de las localidades en donde ha sido capturado no sería raro que también su distribución alcanzara el sudeste del Paraguay y noreste de Argentina.

(1) Bds. World, Vol. III, 1937, p. 194.

(2) Verh. Orn. Gesell. Bay. Vol. XX., 1935, p. 603.

(3) Zeitschrift für die Gesamte Ornithologie, 1885, p. 60, Lám. IX.

(4) Ann. Zool. Mus. Polon., 1926, Vol. 5, p. 140.