

EL CISNE DE CUELLO NEGRO EN LA BARRA DE SAN JUAN

OBSERVACIONES SOBRE SU NIDIFICACION Y CRIA

Por JORGE CASARES

En la estancia La Barra de San Juan, Departamento de Colonia, Uruguay, propiedad de don Aarón de Anchorena, se ha formado, mediante el ensanche de un arroyo, un lago extenso cuyas orillas conservan tal aspecto agreste, con su flora autóctona y sus tres islas donde crecen ceibos,




Foto N° 1.

sauces y totoras, que ha sido elegido como sitio de refugio y procreo por las aves acuáticas, de las cuales hay una apreciable variedad en estado de semicautividad, cantidad que se aumenta en cierta época del año por la concurrencia de otras libres, atraídas por la bondad del sitio y la abundancia de alimentación.

Las fotografías que se acompañan son un ejemplo de los resultados obtenidos. Las láminas representan una pareja de *cisnes de cuello negro* (*Cygnus Melancoryphus*) con sus crías nacidas en la primavera de 1943. La postura empezó el 16 de Agosto y la eclosión se produjo el 26 de Octubre, con diferencia de horas para cada huevo, de modo, pues, que la incubación duró 41 días. La hembra se echa desde el primer huevo y no se




Foto N° 2.

levanta más durante toda la incubación, salvo algún breve momento para alimentarse. Los huevos fueron 4, y 4 las crías, pero una murió en seguida.

La fotografía N° 1 fué tomada con eteleobjetivo el 11 de Noviembre, de manera que los cisnecitos tenían exactamente 16 días y el plumón era blanco.

Circulaban en el agua en grupo de familia, con notable vivacidad; continuamente se encaramaban sobre el lomo del progenitor, con preferencia, y en un momento dado, los tres estaban refugiados entre las alas paternas; desgraciadamente no me dieron tiempo para fotografiarlos. La ascensión la practican por junto a la cola de sus padres, quienes los ayudan con suaves movimientos de las patas y de las alas. A pesar de que no hay estrictamente una diferencia sexual, el macho podía distinguirse por ser algo más fuerte, tener la carúncula de mayor volumen y los rasgos en general más acentuados, como puede apreciarse en las fotografías en donde en ambas aparece en el primer plano.

Al mes el plumón empieza a ponerse gris, coloración en la cual quedan hasta tres meses. Las láminas N^{os} 3 y 2 los representa a los 40 días - 5 de




Foto N^o 3.




Foto N^o 4.

Diciembre, - y ya el plumón comienza a perder su blancura, y los cisnecitos parecen menos nerviosos y más desenvueltos.

Después de los tres meses el gris se acentúa y el cuello se marca con una coloración barrosa, mientras el plumón pierde su ligereza y despuntan las primeras plumas. La foto 4 fué tomada a los 122 días de edad - 25 de Febrero, - cuando toman en su andar cierta solemnidad de mayores. A los cinco meses el cuello se pone negro y a los seis toman el aspecto definitivo, se marca la ceja blanca y crecen las carúnculas.




Foto N° 5.

La lámina 5 representa la reunión casual y oportuna - 11 de Noviembre de 1943 - de la familia de los cisnes con una pareja de gansos blancos (*Coscoroba coscoroba*).
