

otros Totac, y por esto hay también quién le llame así. Los brasileños le llaman Masarico». Es el *Theristicus caudatus* (BODD.).

La «Bandurria de cuello jaspeado» que los guaraníes suelen llamar Carauy, porque le encuentran alguna semejanza con otra ave que llaman Carau, es el *Plegadis guarauna* (LIN.) y ha sido visto por AZARA «en el Paraguay y campos de Buenos Aires, siempre en bandadas de 20 a 60».

(Continuará).

NOTAS SOBRE UNA COLECCIÓN DE AVES

DE LA ISLA DE MARTÍN GARCÍA

POR

ROBERTO DABBENE

(Continuación de la pág. 34)

ORDEN CHARADRIIFORMES (1).

(Chorlos, Becasinas, Teros, Ostreros, Batitúes, etc.)

Familia Charadriidae

9. *Belonopterus cayennensis* *grisescens* (PRŮŽÁK).

(TERO TERO)

[*Parra cayennensis* GMELIN, Syst. Nat. ed. XIII, i, II, p. 706 (1789 — ex BUFF. et DAUBENT., Pl. Enl. 836 — typ. ex Cayenne)].

Vanellus grisescens PRŮŽÁK, Ornithol. Monatsber., IV Jahrg., N.º 2, Febr. 1896, p. 23 (1896 — *N. Chile*) descr. orig.

Vanellus cayennensis (nec *Parra cayennensis* GMELIN) BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 278 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — GIBSON, The Ibis, fifth ser., vol. III, N.º XI, July 1885, p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 205 (Uruguay).

Belonopterus grisescens BRABOURNE and CHUBB, The Birds of South America, I, 1912, p. 38 [Argentina, Paraguay, Uruguay, ? N. Chile.]

Vanellus grisescens C. H. B. GRANT, The Ibis, ninth ser., vol. VI, N.º 22, April 1912, p. 474 (caracteres distintivos de las tres formas).

(1) Según el nuevo arreglo de este orden hecho recientemente por MATHEWS, la familia *Charadriidae* comprende las subfamilias *Lobivanellinae* y *Charadriinae* de SHARPE y la familia *Scolopacidae*, las subfamilias *Totantinae* y *Scolopacinae* de ese autor excepto *Rostratula*. Cf. MATHEWS, Birds Australia, III, i, 1913, p. 2 y III, 4, p. 307.

N.º 8965 g. ♀ ad. Isla Martín García, Enero 15, 1917. — ANTONIO POZZI.
Iris granate.

Esta forma parece intermediaria entre *Belonopterus cayennensis* (GM.) del Brasil y *B. chilensis* (MOL.) del oeste de la República Argentina, Patagonia y Chile. El ejemplar concuerda en todos sus detalles con una serie de la República Argentina, y con un ejemplar de Buena Vista, Bolivia, (colección STEINBACH) todas pertenecientes a la colección del Museo Nacional.

Familia Sco'opacidae

10. *Totanus flavipes* (GMELIN).

(CHORLO PATAS AMARILLAS)

[*Scolopax*] *flavipes* GMELIN, Syst. Nat. ed. XIII, i, 11, p. 659 (1789 — ex LATH. — «Habitat auctumno in *Novboraco*») descr. orig.

Totanus flavipes BARROWS, The Auk, I, N.º 4, Oct. 1884, p. 315 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) (desde Nov. a Abril). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 209 (Uruguay) (en Octubre).

N.º 8965 h. ♂, Isla Martín García, Diciembre 20, 1916. — ANTONIO POZZI.
Iris castaño.

11. *Totanus melanoleucus* (GMELIN).

(CHORLO REAL)

Scolopax] *melanoleuca* GMELIN, Syst. Nat., ed. XIII, i, 11, p. 659 (1789, ex Lath. — «Habitat auctumno in arenis littoris Labrador»; loc. tip. fijada *Chateau Bay*) descr. orig.

Totanus melanoleucus BARROWS, The Auk, I, N.º 4, Oct. 1884, p. 315 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) (todo el año, más numeroso de Agosto a Noviembre). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 209 (Uruguay) en Marzo.

N.º 8965 i. ♂, Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI.
Iris castaño.

12. [*Bartramia longicauda* (BECHSTEIN).

(BATITÚ)

Tringa longicauda BECHSTEIN in LATHAM, Allg. Ueb. Vögel, IV, ii, p. 453 (1812 — Norte America) descr. orig.

Actiturus bartramius BARROWS, The Auk, I, N.º 4, Oct. 1884, p. 315 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) (de Noviembre a Abril). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 209 (Uruguay).

Observada en la isla, pero no coleccionada por el señor POZZI].

13. Gallinago (1) braziliensis braziliensis (SWAINSON).

(BECASINA, CANASTITA)

Scolopax Braziliensis SWAINSON, Faun. Bor. — Amer., Birds, p. 400 note (1831 — *Equinoctial Brazil*) descr. orig.

Gallinago frenata auct. (nec *Scolopax frenata* LICHTENSTEIN) Cf. BERLEPSCH, Novit. Zool., XV, 1908, p. 308.

Becasina 2.^a AZARA, Apunt., etc. III, 1805, p. 275, N.º CCCLXXXVIII.

N.º 8965 j. ♂ ad. Isla Martín García, Diciembre 3, 1916. — ANTONIO POZZI.

Esta especie se distingue de *Gallinago paraguayae* (VIEILLLOT) solamente por tener las secundarias externas más largas que las cobijas primarias.

Familia Jacanidae.

Cf. MATHEWS, Birds Australia III, pt. 4, 1913, p. 312.

14. Jacana jacana (LINNAEUS).

(GALLITO)

[Parra] *Jacana* LINNAEUS, Syst. Nat. ed. XII, I, pt. 2, p. 259 (1766 — ex MARCGRAVE y EDWARDS — hab. «America australis -- hab. subst. Surinam, ex EDWARDS) descr. orig.

Parra jacana LEE, The Ibis, third ser. III, N.º X, April 1873, p. 137 (Río Gato, cerca Gualaguaychú, Entre Ríos). — BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 277 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 205 (Río Negro, Uruguay).

N.º 8965 k. ♂ ad. Isla Martín García, Diciembre 6, 1916. — ANTONIO POZZI.

ORDEN GRUIFORMES.

Subord. Aramf.

Familia Aramidae.

15. [Aramus scolopaceus scolopaceus (GMELIN).

(CARÁU, CARAO, VIUDA LOCA)

[Ardea] *scolopacea* GMELIN, Syst. Nat., ed. XIII, i, II, p. 647; (1789 — ex DAUBENTON, Pl. Enl. 848 — *Cayenne*) descr. orig.

(1) MATHEWS (Birds Australia, III, 3 1813, p. 294) ha separado este género en varios subgéneros y ha colocado la presente especie en el subgénero *Odurella* MATHEWS, l. c., tipo *Scolopax braziliensis* SWAINSON.

Aramus scolopaceus BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 277 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

Esta especie ha sido observada con frecuencia en la isla. No se han traído ejemplares.

Según me lo ha comunicado el señor ERNESTO GIBSON, esta especie se alimenta especialmente del molusco *Ampullaria canaliculata* LAM.]

ORDEN ARDEIFORMES.

Subord. Ardeae.

Familia Ardeidae.

16. [*Ardea cocoi* LINNAEUS.

(GARZA MORA)

[*Ardea*] *Cocoi* LINNAEUS, Syst. Nat., ed. XII, i, p. 237 (1766 — ex BRISON, etc. — ex «Cayenne») descr. orig.

Ardea cocoi BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 271 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 197 (Uruguay).

Observada varias veces en la isla.]

17. *Nycticorax nycticorax naevius* (BODDAERT).

(BRUJA, PÁJARO YAGUÁ)

[*Ardea Nycticorax* LINNAEUS, Syst. Nat., ed. X, i, p. 142, (1758 — hab. in Europa austral — hab. substit. Hungaria ex MARSIGLI).

Ardea naevia BODDAERT, Tabl., Pl. Enl., p. 53 (1783. — ex DAUBENT., Pl. Enl. 939, typ. ex *Cayenne* — av. juv.) descr. orig.

Nycticorax gardeni BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 271 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

Nycticorax obscurus (nec LICHTENSTEIN) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 199 (Uruguay).

Nycticorax tayazu-guira SHARPE, Cat. Birds Brit. Mus., XXVI, p. 155 (1898).

Cf. HARTERT, Bull. B. O. C., XXXV, N.º CC, Nov. 4, 1914, p. 15.

N.º 8965 L. ♀ jov. Isla Martín García, Diciembre 6, 1916. — ANTONIO POZZI. Iris obscuro.

18. *Ixobrychus* ⁽¹⁾ *involucris* (VIEILLOT).

(GARCITA)

Ardea involucris VIEILLOT, Enc. Méth., iii, p. 1127 (1823 — fundada sobre

(1) *Ixobrychus* BILLBERG, Syn. Faunae Scand., I, ii, Aves, 1828, p. 166. Tipo por subsiguiente designación: *Ardea minuta* LINNAEUS. Cf. STONE, Auk, April 1907, p. 192 y BRABOURNE and CHUBB, The Birds of South Amer., I, 1912, p. 52. Reemplaza *Ardetta* GRAY 1842 con el mismo tipo.

«Garza varia» AZARA, Apunt., etc., III 1805, p. 185, N.º CCCLXI. — *Paraguay*) descr. orig.

Ardetta involucris BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 271 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 199 (Montevideo).

N.º 8965 m. ♂ no enteramente adulto. Isla Martín García, Diciembre 21, 1916. — ANTONIO POZZI. Iris castaño; tarsos verdosos.

ORDEN PALAMEDEIFORMES.

(Chajáes)

19. [*Chauna Salvadorii* (BRABOURNE y CHUBB).

(CHAJÁ)

Chauna salvadorii BRABOURNE and CHUBB, The Birds of South Amer., I, p. 53 (1912 — Argentina) nom. nov. pro *Palamedea cristata* SWAINSON, nec LINNAEUS.

Chauna chavaria (nec *Parra chavaria* LINNAEUS) BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 272 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 200 (Paso de Navarro, Río Negro, Uruguay).

Señalada en la isla en varias ocasiones.]

ORDEN ANSERIFORMES.

(Patos, cisnes, etc.)

Familia Anatidae.

20. [*Cygnus melanocoryphus* (MOLINA).

(CISNE DE CUELLO NEGRO)

Anas melanocorypha MOLINA, Saggio Stor. Nat. Chili, p. 234 (1782 — Chile) descr. orig.

Cygnus nigricollis BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 273 (? Concepción). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 200 (estancia Santa Adelaida y estancia Maquette, Uruguay).

Observada en la isla en distintas ocasiones.]

21. [*Dafila spinicauda* (VIEILLOT).

(PATO BARCINO, PATO MAIZERO)

Anas spinicauda VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., V, p. 135 (1816 — fundada sobre «Pato cola aguda» AZARA, Apunt., etc., III, 1805, p. 421, N.º CCCCXXIX. — Buenos Aires) descr. orig.

Dafila spinicauda BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 274 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 201 (Uruguay).

Observada en la isla por el señor ANTONIO POZZI.]

22. *Querquedula versicolor* (VIEILLOT).

(PATO ARGENTINO)

Anas versicolor VIEILLOT, Nouv. Dict., d' Hist. Nat., V, p. 109 (1816 — fundada sobre « Pato pico de tres colores » AZARA, Apun., III, 1805, p. 450, N.º CCCCXL — *Paraguay*) descr. orig.

Querquedula versicolor BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 274 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos). — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 200 (Uruguay).

N.º 8965 n. ♀ ad. Isla Martín García, Enero 19, 1917. — ANTONIO POZZI.

ORDEN PELECANIFORMES.

(Cormoranes y Biguás)

Familia *Phalacrocoracidae*.

23. [*Phalacrocorax vigua vigua* (VIEILLOT).

(BIGUÁ)

Hydrocorax vigua VIEILLOT, Nouv. Dict. d' Hist. Nat., VIII, p. 90 (1817 — fundada sobre « Zaramagullon negro » AZARA, Apunt., III, 1805, p. 395, N.º CCCCXXIII — *Paraguay*) descr. orig.

Phalacrocorax brasiliensis BARROWS, The Auk, I, N.º 3, July 1884, p. 270 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) — APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 197 (Montevideo, Flores, Soriano y Río Negro, Uruguay).

Observada con frecuencia en la isla.

Aprovecho la ocasión para hacer notar, que según el señor JUAN MOGENSEN, los especímenes de esta especie de biguá, del noroeste de la República Argentina, son distintos de los de la costa de Patagonia, y probablemente pertenecen a una forma diferente de la que habita la costa del mar.]

ORDEN ACCIPITRIFORMES.

Familia *Falconidae*.

Subfam. Polyborinae.

24. [*Polyborus plancus* (MILLER).

(CARANCHO)

Falco plancus MILLER, Var. Subj. Nat. Hist., pl. 17 (1778 — *Tierra del*

Fuego) [= *Polyborus tharus* (MOLINA 1782) y auctorum] Cf. BRA-
BOURNE y CHUBB, *Birds South Amer.*, I, 1912, p. 62.

Polyborus tharus BARROWS, *The Auk*, I, N.º 2, April 1884, p. 111 (Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos). — GIBSON, *The Ibis*, fifth ser.,
vol. III, N.º XI, July 1885, p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN,
The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 186 (Arro-
yo Grande, Uruguay).

Común en la isla. No se han traído ejemplares.]

25. [*Milvago chimango* (VIEILLOT).

(CHIMANGO)

Polyborus chimango VIEILLOT, *Nouv. Dict. d'Hist. Nat.*, V, p. 260 (1816 —
fundada sobre «Chimango» AZARA, *Apunt.*, etc., I, 1802, p. 47,
N.º V — *Paraguay*) descr. orig.

Milvago chimango GOULD in DARWIN, *The Zool. of the Voyage «Beagle»*,
III, *Birds*, 1841, p. 14 (Maldonado, Uruguay). — BARROWS, *The*
Auk, I, N.º 2, April 1884, p. 111 (Concepción del Uruguay, Entre
Ríos). — GIBSON, *The Ibis*, fifth ser., vol. III, N.º XI, July 1885,
p. 282 (Paysandú, Uruguay). — APLIN, *The Ibis*, sixth ser., vol.
VI, N.º XXII, April 1894, p. 196 (Santa Elena, Río Negro, y Santa
Flores, Uruguay).

Observada con frecuencia en la isla. No se han traído
ejemplares.]

Subfamilia **Falconinae**.

26. *Cerchneis sparverius australis* (RIDGWAY).

(HALCONCITO DE DORSO ROJIZO)

[*Falco sparverius* LINNAEUS, *Syst. Nat.*, ed. X, I, p. 90 (1758 — ex CA-
TESBY — Virginia, Carolina).]

Falco sparverius australis RIDGWAY in BAIRD, BREWER and RIDGWAY,
Hist. North Amer. Birds, III, p. 166 (1874 — Paraná, Capt. PAGE—
loc. tip. subst. *Bahía* ⁽¹⁾ auct. CHAPMAN 1915).

Falco gracilis (nec LESSON) SWAINSON, *Anim. in Ménag.*, 1838, p. 281
(Bahía, Brasil).

Tinnunculus sparverius (nec *Falco sparverius* LINNAEUS) LEE, *The Ibis*,
third ser., vol. III, N.º X, April 1873, p. 135 (Gualedaychú).

Falco sparverius (nec LINNAEUS) BARROWS, *The Auk*, I, N.º 2, April 1884,
p. 110 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

(1) El nombre «australis» habiendo sido propuesto por RIDGWAY como un substituto
de «gracilis» SWAINSON, ya empleado; Bahía debe ser la localidad típica de la subespe-
cie. Cf. CHAPMAN, *Bull. Amer. Mus.*, N. H. XXXIV, Art. XI, Mayo 27, 1915, p. 380.

Tinnunculus cinnamominus (nec *Falco cinnamominus* SWAINSON) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 195 (Río Negro, Santa Elena, y Las Coronas, Uruguay).

Cerchneis sparverius australis CHAPMAN, Bull. Amer. Mus. N. H. XXXIV, Art. XI, Mayo 27, 1915, p. 380. [Desde la pendiente este de los Andes en Perú, Bolivia y Argentina al Atlántico; al norte al Amazonas].

De esta forma de halconcito, el señor ANTONIO POZZI trajo un ejemplar vivo.

Familia **Buteonidae**.

27. *Rostrhamus sociabilis* (VIEILLOT).

(CARACOLERO)

Herpetotheres sociabilis VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XVIII, p. 318 (1817 — fundada sobre «Gavilán del estero sociable» AZARA, Apunt., etc., I, 1802, p. 84, N.º XVI. Av. juv. — Sud América, Lat. 27º — 30º S. in districto de *Corrientes* y en el *Río de la Plata*) descr. orig.

Cymindes leucopygus SPIX, Av. Bras., I, 1824, p. 7 tab. II («ad. flumen Amazonum»). Cf. HELLMAYR, Abhandl. K. Bayer. Akad. Wiss., II, Kl., Bd. XXII, 3.ª Abt. 1905, p. 568, 569.

Rostrhamus sociabilis LEE, The Ibis, third ser., vol. III, N.º X, April 1873, p. 135 (Guauguaychú, Entre Ríos).

Rostrhamus sociabilis APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 195 (Montevideo).

Rostrhamus leucopygus BARROWS, The Auk, I, N.º 2, April 1884, p. III (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

N.º 8965 o. ♂ juv. Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI. — Iris castaño.

N.º 8965 p. ♂ ad. Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI. — Iris granate.

(Continuara).

NOTAS

SOBRE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS ESPECIES DE AVES

Dos aves nuevas para la Argentina. — El señor JUAN MOGENSEN me ha enviado para la determinación dos pieles de aves que trajo de su último viaje a Misiones. Pertenecen a dos especies nuevas para nuestra avifauna y son las siguientes: