

Tinnunculus cinnamominus (nec *Falco cinnamominus* SWAINSON) APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 195 (Río Negro, Santa Elena, y Las Coronas, Uruguay).

Certhneis sparverius australis CHAPMAN, Bull Amer. Mus. N. H. XXXIV, Art. XI, Mayo 27, 1915, p. 380. [Desde la pendiente este de los Andes en Perú, Bolivia y Argentina al Atlántico; al norte al Amazonas].

De esta forma de halconcito, el señor ANTONIO Pozzi trajo un ejemplar vivo.

Familia **Buteonidae**

27. Rostrhamus sociabilis (VIEILLOT).

(CARACOLERO)

Herpetotheres sociabilis VIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XVIII, p. 318 (1817 — fundada sobre «Gavilán del estero sociable» AZARA, Apunt., etc., I, 1802, p. 84, N.º XVI. Av. juv. — Sud América, Lat. 27° — 30° S. in distrito de Corrientes y en el Río de la Plata) descr. orig.

Cymindes leucopygus SPIX, Av Bras, I, 1824, p. 7 tab. II («ad. flumen Amazonum»). Cf. HELLMAYR, Abhandl. K. Bayer. Akad. Wiss., II, Kl., Bd. XXII, 3.ª Abt. 1905, p. 568, 569.

Rostrhamus sociabilis LEE, The Ibis, third ser., vol. III, N.º X, April 1873, p. 135 (Gualeguaychú, Entre Ríos).

Rostrhamus sociabilis APLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.º XXII, April 1894, p. 195 (Montevideo).

Rostrhamus leucopygus BARROWS, The Auk, I, N.º 2, April 1884, p. 111 (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).

N.º 8965 o. ♀ juv. Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI. — Iris castaño.

N.º 8965 p. ♂ ad. Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. — ANTONIO POZZI. — Iris granate.

(Continuará).

NOTAS

SOBRE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS
ESPECIES DE AVES

Dos aves nuevas para la Argentina. — El señor JUAN MOGENSEN me ha enviado para la determinación dos pieles de aves que trajo de su último viaje a Misiones. Pertencen a dos especies nuevas para nuestra avifauna y son las siguientes:

1. *Amaurospiza moesta* (HARTLAUB).

Sporophila moesta HARTLAUB, Journ. f. Ornith., p. 36 (1853
— « Brasilien ») (♂).

Amaurospiza coerulatra CABANIS, Journ. f. Ornith., 1866,
p. 306 (Río de Janeiro — Mus. Zürich) (♂).

Haplospiza? crassirostris PELZELN, Zur Ornith. Bras., 1869,
pp. 227, 333 (São Paulo) (♀).

Amaurospiza axillaris SHARPE, Cat. Birds Brit. Mus., XII,
p. 157, 1888 (Brasil: Río — ex coll. Gould) (♂).

Cf. HELLMAYR, Verh. k. k. Zool. — Bot. Gesell. Wien, 1904,
p. 516.

♂ ad., Iguazú, Misiones, Febr. 2 1917 — JUAN MOGENSEN
en colección STEWART SHIPTON, Concepción, Tucumán.
Ala 67 mm., cola 59 mm., tarso 19 mm., pico 11 mm.,
ancho del mismo en la base 10 mm., altura en la base
8 mm. Iris pardo, pico y tarsos negros azulados.

Esta especie, muy rara en las colecciones, era conocida únicamente por pocos ejemplares procedentes del sudeste del Brasil (Río Janeiro y São Paulo) no habiendo sido señalada en el Paraguay.

2. *Phyllomyias brevirostris* (SPIK).

♀ ad., Febr. 6, 1917, Iguazú, Misiones — JUAN MOGENSEN
en colección STEWART SHIPTON, Concepción, Tucumán.

Esta especie había sido señalada en Puerto Bertoni (Paraguay) por el señor W. BERTONI (Fauna paraguaya, aves, 1914, p. 56).

Especies de la avifauna del sudeste del Brasil, obtenidas recientemente en Santa Ana, Misiones. — El señor FRANCISCO M. RODRÍGUEZ ha enviado desde Santa Ana, Misiones, algunas pieles de aves pertenecientes a especies pocas veces señaladas en el territorio argentino. Son las siguientes:

Crypturellus parvirostris (WAGL.). ♂ ad., Santa Ana, XI, 1917.

Esta especie de perdiz del monte había sido señalada en Mocovi (Chaco Austral) por el señor SANTIAGO VENTURI, quien encontró también los huevos.

Pionopsitta pileata (SCOP.). ♂ y ♀ adultos, Santa Ana, XI, 1917.

Esta especie de cotorra había sido conseguida por mi cerca de San Ignacio, Misiones, en Noviembre de 1900.

Platytriccus mystaceus (VIEILL.). ♂ ad., Santa Ana, 19, XI, 1917.

Este tiránido sólo había sido obtenido por WHITE en San Javier, Misiones.

Legatus albicollis (VIEILL.). ♂ ad., 25, XII, 1917, Santa Ana.

Obtenido en Ledesma, Jujuy, y en Tucumán por DINELLI.

Grallaria varia imperator LAFR. ♂ ad., X, 1914, Santa Ana.

Señalada anteriormente en Misiones por W. BERTONI, pero sin especificar la localidad.

Todas estas especies han sido también obtenidas recientemente en dicho territorio por el señor JUAN MOGENSEN.

Captura de dos especies de «guacamayos» en el norte de la República Argentina. — Un ejemplar del guacamayo verde, de frente roja:

Ara militaris militaris (LINN.) ha sido obtenido en Yacuiba sobre el límite de la provincia de Salta con Bolivia, en Febrero 1916, por el señor JOSÉ STEINBACH. Este punto señala el record de la distribución austral de esta especie, esparcida desde Méjico y Centro América sobre la parte occidental y tropical del continente sudamericano al este de los Andes.

El señor ULPIANO CÁCERES envió al Museo un ejemplar del guacamayo rojo: *Ara chloroptera* G. R. GRAY, cazado en Formosa en el mes de Diciembre de 1917.

Captura de dos petreles poco comunes en la costa norte de la Argentina. — Un ejemplar del petrel azulado perteneciente a la forma *Heteroptrion desolatus Banksi* (SMITH) ha sido enviado al Museo Nacional de Historia Natural por el capitán de fragata don PEDRO S. CASAL, quien lo obtuvo frente a la costa

de la provincia de Buenos Aires durante los cruceros efectuados por el buque de la armada a su mando «Patria» en el mes de Agosto de 1914.

Otro ejemplar de la misma especie ha sido obtenido más tarde por el preparador señor AURELIO POZZI en el Golfo Nuevo, Chubut.

El 2 de Setiembre de 1917, cerca de la costa, entre el golfo de San Matías y Necochea, cayó extenuado a bordo del balizador «Alferez Mackinlay» un ejemplar del petrel zambullidor, perteneciente a la forma *Pelecanoides urinatrix Coppingeri* MATHEWS. Recogido vivo, el ejemplar fué remitido al Museo

por el teniente de navío señor JULIÁN FABLET. El mismo día que fué recibido se le envió al Jardín Zoológico en donde lo soltaron en los lagos después de haberle cortadas las plumas de un ala. Pero el animal rehusó todas clases de alimentos y se murió a los dos días.

He comparado este ejemplar con dos procedentes de Cumberland Bay, Georgia del Sur, y pertenecientes a la especie *Pelecanoides georgica* MURPHY y HARPER⁽¹⁾ recientemente descrita, pero no he podido encontrar diferencia ninguna.

Dos especies raras de Falcónidos. — *Dinospizias pectoralis* (BR.) y *Cooperastur poliogaster* (TEMM.) son dos aves muy raras en las colecciones, y han sido encontradas esporádicamente sobre puntos muy distantes del continente sudamericano. De la primera especie, el señor A. DE WINKELRIED BERTONI ha cazado en Junio de 1916 un ejemplar hembra no enteramente adulta en Puerto Bertoni, sobre el alto Paraná, Paraguay, frente al territorio de Misiones. Este ejemplar que el señor BERTONI me ha enviado para examinar, concuerda en todos los caracteres con otro adulto del mismo sexo, conservado en el Museo Nacional, obtenido hace muchos años por el doctor GERMÁN BURMEISTER en Río de Janeiro.

CABANIS⁽²⁾ y últimamente HELLMAYR⁽³⁾ han hecho notar que esta especie es genéricamente distinta de cualquiera de los accipítridos americanos, y el primero observa que en el tipo de la coloración se asemeja bastante a otro falcónido americano, el *Spizaëtus ornatus* (DAUD.); pero se distingue de éste por otros caracteres más importantes.

Además de los dos ejemplares citados, se conocen de esta especie únicamente los siguientes:

Un ejemplar ($\textcircled{♀}$ ad.) de Sarayacú, Ecuador (colección SALVIN y GODMAN).

Un ejemplar de Borba, Río Madeira, Brasil, obtenido por NATTERER.

Dos ejemplares de Ypanema, São Paulo, Brasil, conseguido por el mismo naturalista.

⁽¹⁾ Bull. Amer. Mus. N. H., XXXV, 1916, Art. VII, p. 66.

⁽²⁾ Journ. für Ornith. (22), 1874, p. 229.

⁽³⁾ Novit. Zool., XVII, 1910, p. 410.

Un ejemplar de Bauru, São Paulo (colección del Museo Paulista).

Un ejemplar de Bahía, en la colección del conde H. v. BERLEPSCH.

Un ejemplar (Δ ad.) de Cantagallo, Río de Janeiro, obtenido por el señor C. EULER y existente en las colecciones del Museo de Berlín.

La segunda especie, *Cooperastur poliogaster* (TEMM.), parece ser aún más escasa.

Además del tipo (γ ad.) obtenido por NATTERER en Ypanema, São Paulo, y existente en el Museo de Leyden, se conocen solamente los siguientes ejemplares:

Uno, adulto, procedente del valle del Río Amazonas (colección SALVIN-GODMAN).

Un ejemplar joven de Puerto Bertoni, Paraguay (colección A. de W. BERTONI).

Otro (Δ no enteramente adulto) conseguido en Santa Ana, Misiones Argentinas, en Agosto de 1912 por el señor FRANCISCO M. RODRÍGUEZ y existente en las colecciones del Museo Nacional de Buenos Aires.

R. DABBENE.

NIDO Y PICHONES DE UN GAVILÁN

PARABUTEO UNICINCTUS (TEMMINCK)

El artístico grupo representado en la fotografía (lám. I) constituye una hermosa preparación taxidérmica, adquirida, recientemente por el Museo Nacional de Historia Natural. Su autor es el conocido colecciónista señor DEMETRIO RODRÍGUEZ.

Tanto el nido como las aves fueron obtenidos en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, por el mismo señor RODRÍGUEZ a mediados del mes de Octubre.

Este gavilán no es escaso en la provincia mencionada, y WITTINGTON, en sus notas, (¹), dice haber conseguido en Lomas de Zamora varios especímenes de esta ave, así como sus nidos, pero éstos estaban probablemente abandonados, pues no hace

(¹) *The Ibis*, 1888, p. 469