

**Catharacta skua chilensis** (Bp.) — «Skua» o «Gaviota negra». — Un individuo pasó apresuradamente por sobre la Isla de los Conejos.

**Pelecanoides magellani** (Math.). — «Petrel». — Poco antes de desembarcar en la Isla de los Conejos observamos a tres *Pelecanoides* nadando sobre el agua tranquila y algo parecidos a *Podiceps r. chilensis*. Al acercarnos zambulleron, primeramente bajando sus cabezas y luego despaciosamente siguiéndole sus cuerpos sin chapotear o hacer salpicaduras, deslizándose límpidamente al agua. Esta acción fué repetida por segunda vez y al rato dos se dieron al vuelo, levantándose pesadamente y apenas librándose de la superficie del agua con un movimiento continuo y rápido de las alas. Su vuelo, con la cabeza bien erguida y el cuerpo más inclinado que en la mayoría de las aves, recuerda el de *Rallus*.

A pesar de esto, he visto, por presunción este mismo pájaro, en el Estrecho de Magallanes, tomar los vuelos más arrojados y rápidos en contra o al través del viento hasta desaparecer por completo de vista. La cola, especialmente al ascender, parecía anchamente abierta.

**Aechmophorus major** (Bodd.) — «Macá». — Varias parejas en Yewin, algunas de ellas seguramente nidificaban. En los lagos de las montañas también vimos algunas pocas que demostraban su curiosidad característica mientras que nosotros evitábamos el terrible matorral de arbustos y caminábamos en el agua.

**Podiceps occipitalis occipitalis** (Garn.). — «Macá». — Una pareja tenía un nido con huevos en el mismo lago ocupado por una *Fulica*. Es este el caso único en que he visto esta ave alejada de los lagos del nordeste de la Tierra del Fuego, en donde nidifica en colonias densamente pobladas a veces por muchos centenares de individuos.

## EL PESO DE LAS AVES

Por ARÍSTIDES FIORA

(Conclusión. Véase pág. 188)

Familia Tyrannidae (Benteveos, tijeretas, churrinches, viudas).

87) **Agriornis montana maritima** (Lafr. et Orb.) «arriero».

2 ejem. de Tumbaya, V-30.

88) **Xolmis irupero irupero** (Vieill.) «nievecita».

1 ejem. de Zapla, VI-28; 1 de Las Cañadas, VIII-29; 1 de Arroyo

Yutu-mayo, IX-29; 1 de Cuyaya, V-30; 1 de Los Blancos, VI-30; 1 de Potrerillos, VI-30; 1 de La Almona, II-31; 1 de Juan Galán, VI-31.

- 89) **Ochthoea o. oenanthoides** (Lafr. et Orb.) « pitajo ».  
2 ejem. de Santa Ana, VII-31.
- 90) **Satrapa icterophrys** (Vieill.).  
1 ejem. de Zapla, VII-29; 1 de León, II-30; 1 de Payo, I-32.
- 91) **Knipolegus a. aterrimus** (Kaup.).  
1 ejem. de Banda de castañeda, V-29; 1 de La Toma, V-30.
- 92) **Muscisaxicola cinerea** (Phil. et Landb.).  
2 ejem. de Santa Ana, VII-31; 1 de Laguna Colorada, II-32.
- 93) **Lessonia rufa oreas** (Sel. et Salv.) « yunga ».  
1 ejem. de Puesto del Marquez, VI-30.
- 94) **Machetornis r. rixosa** (Vieill.) « garrapatero ».  
4 ejem. ♂ ♀ de Río Lavayén, VII-29; 2 ♀ de Río de Lozano, IX-29; 3 de Las Cañadas, II-30.
- 95) **Serpophaga nigricans** (Vieill.) « carpinterito cenizo ».  
1 ejem. de Zapla, V-29; 1 de Trujillo (Río Lavayén), VIII-31.
- 96) **Euscarthmornis m. margaritaceiventer** (Lafr. et Orb.).  
1 ejem. de Trujillo (Río Lavayén), VIII-31.
- 97) **Suiriri suiriri** (Vieill.) « cirilo » o « chisera ».  
1 ejem. ♂ de Zapla, VII-29; 1 de Cuyaya, V-30; 2 ♀ de Río de La Toma, V-30; 2 de Tilquiza, I-32.
- 98) **Pitangus sulphuratus bolivianus** (Lafr.) « quetupí ».  
1 ejem. de Zapla, VIII-28; 1 de Jujuy (ciudad) XII-28; 4 de San Pedrito, VI-29; 1 de Río de Lozano, IX-29; 1 de Río de Reyes, VI-30; 2 de La Almona, II-31.
- 99) **Pyrocephalus r. rubinus** (Bodd.) « fueguito ».  
1 ejem. de Arroyo Yutu-mayo, IX-29; 1 de León, II-30; 1 de Arroyo de Chyja, V-30.
- 100) **Sayornis nigricans latirostris** (Cab. et Heine).  
1 ejem. de Río Valle Grande, VII-31; 1 de Río Jordán, VII-31.
- 101) **Myiarchus ferox australis** Hellmayr.  
1 ejem. de El Palmar (San Miguel del Rastro) IX-31.
- 102) **Empidonomus a. aurantio-atro-cristatus** (Lafr. et Orb.) « bur-listo ».  
1 ejem. de Ciénaga del Totoral, XI-29; 2 de La Almona, II-30; 5 ♂ de El Palmar (San Miguel del Rastro), XI-31.
- 103) **Tyrannus m. melancholicus** Vieill. « neblina ».  
2 ejem. de El Palmar (San Miguel del Rastro), XI-31.
- 104) **Muscivora tyrannus** (Linn.) « tijereta ».  
3 ejem. de Yaresmé, XI-29.



FIG. 1. — Vista de la Laguna Colorada (4.150 metros), cerca de Tilcara (Jujuy). Lugar frecuentado por patos, leuquenchos, parinas, keus y yacstos.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
96	<i>E. m. margaritaceiventer</i> (1) . . . .	—	—	7
95	<i>S. nigricans</i> (2) . . . . .	—	—	8
99	<i>P. r. rubinus</i> (3) . . . . .	10	11	10,5
93	<i>L. r. orea</i> (1) . . . . .	—	—	13
89	<i>O. o. oenanthoides</i> (2) . . . . .	—	—	19,2
91	<i>K. a. aterrimus</i> (2) . . . . .	21,3	22	21,6
92	<i>M. cinerea</i> (3) . . . . .	23	24,2	23,6
101	<i>M. f. australis</i> (1) . . . . .	—	—	25
100	<i>S. n. latirostris</i> (2) . . . . .	25	26,4	25,7
94	<i>M. r. rixosa</i> (9) . . . . .	25	30	27
88	<i>X. i. irupero</i> (8) . . . . .	25	31	28,3
104	<i>M. tyrannus</i> (3) . . . . .	25	30	28,5
97	<i>S. suiriri</i> (6) . . . . .	25	31	28,6
103	<i>T. m. melancholicus</i> (2) . . . . .	—	—	29,2
90	<i>S. icterophrys</i> (3) . . . . .	29	32	30,5
102	<i>E. a. a. crist. a. a. cristatus</i> (8) .	27	46	35,2
87	<i>A. m. maritima</i> (2) . . . . .	—	—	52
98	<i>P. s. bolivianus</i> (10) . . . . .	57	71	67,6

Familia **Phytotomidae** (*Cortadores de plantas*).

105) **Phytotoma r. rutila** Vieill. « pasacanero ».

1 ejem. de Tumbaya, IV-30; 1 de Quebrada de Huasa-mayu (Tilcara), VII-30; 1 de Uquía, X-30.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
105	<i>P. r. rutila</i> (3) . . . . .	76	80	77,3

Familia **Hirundinidae** (*Golondrinas*).

106) **Phaeoprogne tapera** (Linn).

1 ejem. de Río Lavayén, XI-31; 1 de Los Bayos, XII-31.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
106	<i>P. tapera</i> (2) . . . . .	—	—	30

Familia **Turdidae** (*Zorzales*).107) **Turdus anthracinus** Burm. « chihuano ».

5 ejem. ♂ de Tumbaya, III-28; 2 de El Nogalar (Río de Lozano), IX-29; 3 ♂ ♀ de Río Las Cabañas, V-30.

108) **Planesticus r. rufiventris** (Vieill.) « chalchalero colorado ».

3 ejem. de Banda de Castañeda, V-29; 2 de Cuyaya, V-30; 1 de Río de Las Cabañas, V-30; 2 de Pampichuela, VII-31; 1 de Valle Grande (Pueblo), VII-31.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
108	<i>P. r. rufiventris</i> (9) . . . . .	68	88	74,3
107	<i>T. anthracinus</i> (10) . . . . .	75	120	93,3



FIG. 2. — Quebrada del Río Grande, frente a Huacalera (3.500 m. sobre el mar). Habitat de yutas, yacostos, halcones, águilas y dendrocoláptidos.

Familia **Mimidae** (*Calandrias*).109) **Mimus modulator** (Gould) « calandria ».

1 ejem. de Quebrada de Hornochuaico, V-31; 1 de Banda de Castañeda, VI-31.

110) **Mimus patagonicus** (Lafr. et Orb.) « quererınca ».

1 ejem. de Quebrada de Hornohuaico, IV-30.

111) **Mimus triurus** (Vieill.) « calandria ».

1 ejem. de Trujillo, VIII-31.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
111	<i>M. triurus</i> (1) . . . . .	—	—	42
109	<i>M. modulator</i> (2) . . . . .	—	—	60
110	<i>M. patagonicus</i> (1) . . . . .	—	—	80




Fig. 3. — Quebrada del Río Yala (2.000 m.). Habitat de chiguancos, loros, pavas del monte y torcazas.

#### Familia Mniotiltidae.

112) **Compsothlypis p. pitaiayumi** (Vieill.).

1 ejem. de Río Las Cabañas, VI-30.

113) **Basileuterus auricapillus** (Swains.).

1 ejem. de Río Lorrenta, VII-31; 1 de Volcán Colorado, VII-31.

114) **Myioborus brunneiceps** (Orb. et Lafr.).

1 ejem. de Termas de Reyes, VII-29.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
112	<i>C. p. pitayumi</i> (1) . . . . .	—	—	7
114	<i>M. brunneiceps</i> (1) . . . . .	—	—	9
113	<i>B. auricapillus</i> (2) . . . . .	17	18	17,5




Fig. 4. — Río Las Capillas (800 m.). Lugar frecuentado por pavas del monte, palomas, garzas, loros, martin pescadores, cacuy, carpinteros, alcatraces.

Familia **Tanagridae** (*Siete colores, naranjeros*).

115) **Atlapetes fulviceps** (Laf. et Orb.).

1 ejem. de Quebrada Ancha, III-30.

116) **Thraupis bonariensis** (Gm.) « naranjero ».

2 ejem. ♂ ♀ de Tumbaya, III-28; 1 ♂ de Río de Perico, IX-29.  
3 ♂ ♀ de León, II-30; 1 ♂ de La Almona, II-31; 1 ♂ de Payo, I-32.

117) **Thraupis sayaca** (Linn.) « celestino ».

1 ejem. de Garrapatal, VIII-29; 2 de El Pongo, V-31; 2 de El Palmar (San Miguel del Rastro), XI-31.

118) **Piranga flava Azarae** (d'Orb.).

1 ejem. de Arroyo El Salado, XI-31.

Nº	Especie	p. min.	p. máx.	p. t/m
115	<i>A. fulviceps</i> (1) . . . . .	—	—	28,2
118	<i>P. f. azarae</i> (1) . . . . .	—	—	30
116	<i>T. bonariensis</i> (8) . . . . .	30	34	31,3
117	<i>T. sayaca</i> (5) . . . . .	42	44	41



FIG. 5. — Abra de Corral Colorado (4.000 m.). Un «ronqui», habitat preferido por los dendrocoláptidos y fringílidos de la región.

Familia **Fringillidae** (*Juan chiviros, mixtos, cabecitas negras, chingolos*).

119) **Saltator a. aurantirostris** Vieill. « viracocha » o « pepitero ».

1 ejem. ♂ de León, II-30; 2 ♂ Pampichuela, VII-31; 1 de Valle Grande (Pueblo), VII-31; 1 de Trujillo, VIII-31; 1 de Tumbaya, II-32.

120) **Saltator c. caerulescens** Vieill. « habero ».

1 ejem. de Ciénaga de El Totoral, VIII-29; 5 de Las Cañadas, IX-29; 1 de Banda de Castañeda, V-30.

121) **Sporophila caerulescens** (Vieill.) « corbatita ».

1 ejem. ♀ de León, II-30; 1 ♀ de Yaresmé, II-30; 1 de Quebrada Ancha, III-30; 1 de La Almona, II-31.



- 122) **Pheucticus aureo-ventris** (Lafr. et Orb.) « reina mora ».  
2 ejem. de San Antonio, VII-29; 5 de Río Las Cabañas, V-30; 2 de Alto Las Lajitas, V-30; 1 de Paño, II-31.
- 123) **Pseudochloris aureiventris Mendozae** Sharp. « canarito ».  
2 ejem. de Capilla de Punta Corral, III-30; 3 de idem., II-31.
- 124) **Pseudochloris olivascens sordida** (Chap.) « catitas ».  
6 ejem. ♂ de Santa Ana, VII-31.
- 125) **Cyanocompsa cyanea argentina** (Sharp.) « pepitero ».  
6 ejem. de Río Lavayén, X-27; 1 ♂ de Las Pampitas, X-28; 1 ♀ de Banda de Castañeda, V-29; 5 de Las Cañadas, VI-29; 1 ♀ de Palos Blancos, VII-29; 2 ♂ ♀ de Los Blancos, VI-30; 1 ♀ de San Lucas VIII-30; 1 ♂ de La Escalera, VIII-31.
- 126) **Spinus ictericus** (Licht.) « cabecita negra ».  
2 ejem. de León, XI-29; 1 de Tilcara, X-30; 1 de Uquía, XII-30.
- 127) **Sicalis a. arvensis** (Kittl.) « afrecherero ».  
2 ejem. ♂ de El Carmen, VIII-29; 4 ♀ de Los Lapachos, VIII-29; 2 ♂ de León, II-30.
- 128) **Sicalis flaveola Pelzelni** Sel. « canarito ».  
1 ejem. de La Almona, II-31; 2 de San Pedrito, VII-31; 1 de El Arenal, VII-31; 2 de Pampichuela, VII-31.
- 129) **Brachyspiza capensis** (P. L. S. Müll.) « papachiuchis ».  
2 ejem. de Banda de Castañeda, V-29; 1 de Quebrada Ancha, III-30; 2 de Tumbaya, V-30; 2 de La Almona, II-31; 2 de El Pongo, V-31.
- 130) **Zonotrichia strigiceps Dabbenei** Hellm. « chisca ».  
2 ejem. de Los Lapachos, XI-29; 1 de Cuyaya, V-29; 2 de Estación Perico (F. C. C. N. A.), XII-29; 1 de La Almona, II-31; 2 de El Pongo, V-31.
- 131) **Poospiza erythrophrys** Sel.  
1 ejem. de Pampichuela, VII-31; 1 de Valle Grande (Pueblo), VII-31.
- 132) **Poospiza melanoleuca** (Lafr. et Orb.) « corbatita ».  
1 ejem. de La Almona, II-31; 1 de Tilquiza, I-32.
- 133) **Poospiza Whitii** Sel.  
1 ejem. de Valle Grande (Pueblo), VII-31.
- 134) **Embernagra olivascens** (Lafr. et Orb.) « chichafria ».  
1 ejem. de Las Cañadas, VIII-29; 1 de Río La Cabaña, VII-30; 1 de La Almona, II-31.
- 135) **Phrygilus alaudinus** (Kittl.).  
2 ejem. de Santa Ana, VII-31.
- 136) **Phrygilus atriceps** (Lafr. et Orb.) « amarillos ».  
1 ejem. de Quebrada de Punta Corral, III-30; 3 ♂ ♀ de Caspalá, VII-31.

- 137) **Phrygilus fruticeti** (Kittl.) « chiquilines ».  
2 ejem. de Quebrada de Punta Corral, III-30.
- 138) **Phrygilus plebeius** Cab.  
1 ejem. de Punta Corral, III-30; 1 de Santa Ana, VII-31.
- 139) **Coryphospingus c. cucullatus** (P. L. S. Müll.) « brasita ».  
2 ejem. ♂ ♀ de San Pedrito, X-28; 1 ♀ de Zapla, VII-29; 2 ♂ de Cuyaya, V-30; 3 ♀ ♂ de Río de Chyja, VI-30.
- 140) **Arremon flavirostris D'Orbigny** Sel.  
1 ejem. de Banda de Castañeda, VI-29; 2 de San Lucas, VIII-30; 1 de Chaguaral, VIII-30; 1 de La Almona, II-31; 1 de Río Sunchal, VII-31.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
126	<i>S. ictericus</i> (4) . . . . .	7	8	7,7
132	<i>P. melanoleuca</i> (2) . . . . .	—	—	9
121	<i>S. caerulescens</i> (4) . . . . .	—	—	10
131	<i>P. erythrophrys</i> (2) . . . . .	13,2	15	14,1
127	<i>S. a. arvensis</i> (8) . . . . .	15	16,5	15,3
135	<i>P. plebeius</i> (2) . . . . .	15	15,6	15,3
128	<i>S. f. Pelzelni</i> (6) . . . . .	15	16,8	15,8
139	<i>C. c. cucullatus</i> (8) . . . . .	15	18,4	16,7
133	<i>P. Whitii</i> (1) . . . . .	—	—	17
140	<i>A. f. D'Orbigny</i> (6) . . . . .	20	25	22,1
124	<i>P. o. sordida</i> (6) . . . . .	20,4	24,2	22,8
136	<i>P. atriceps</i> (4) . . . . .	—	—	24
129	<i>B. capensis</i> (9) . . . . .	20,5	28	24,3
123	<i>P. a. Mendozae</i> (5) . . . . .	24	25	24,5
125	<i>C. cyanea argentina</i> (18) . . . . .	27	28	27,5
135	<i>P. alaudinus</i> (2) . . . . .	—	—	28,8
137	<i>P. fruticeti</i> (2) . . . . .	29	34	31,5
130	<i>Z. s. Dabbenei</i> (8) . . . . .	30	39,5	34
134	<i>E. olivascens</i> (3) . . . . .	45	46	45,5
119	<i>P. a. aurantirostris</i> (6) . . . . .	38	55,6	47
122	<i>P. aureoventris</i> (10) . . . . .	50	59	55
120	<i>S. c. caerulescens</i> (7) . . . . .	57	62	59,2

Familia **Icteridae** (Boyeros, tordos, pechos colorados).

- 141) **Archiplanus albirostris** (Vieill.) « bolsero ».  
1 ejem. de Río La Toma, V-30; 2 de Pampichuela, VII-31.
- 142) **Agelaioides b. badius** (Vieill.) « taracchi ».  
2 ejem. de Las Pampitas, X-28; 2 de Banda de Castañeda, V-30;  
4 ♂ ♀ de Cuyaya, VI-30; 2 ♂ ♀ de Tilcara, XI-30; 2 de El Pongo, V-31.
- 143) **Molothrus b. bonariensis** (Gm.) « tordo ».  
1 ejem. ♂ de Las Pampitas, X-28; 3 ♂ de Río Lavayén, VII-29;

2 de San Juancito, VII-29; 2 ♀ de León, IX-29; 2 ♂ ♀ de Tilcara, XI-30;  
3 ♂ ♀ de La Escalera, VIII-31.

144) **Molothrus (Streptovagus) rufo-axillaris** Cassin « tordo ».

2 ejem. de Cuyaya, V-30.

145) **Leistes militaris superciliaris** (Bp.) « tordo alfalfero ».

1 ejem. ♂ de La Almona, II-31; 1 ♀ de El Ceibal, IV-31.

146) **Trupialis m. militaris** (Linn.) « federal ».

1 ejem. de El Chilcar, V-31; 1 de Humahuaca, VII-31.

147) **Icterus p. pyrropterus** (Vieill.) « boyero ».

1 ejem. de Las Pampitas, IX-29; 1 de Los Blancos, VI-30.

148) **Gnorimopsar ch. chopi** (Vieill.) « tordo cruceño ».

1 ejem. ♂ de (cautividad), III-30; 1 ♂ de idem, VII-31; 1 ♂ de idem, X-31.

149) **Icterus croconotus** (Vieill.) « matico ».

1 ejem. ♂ de (cautividad), X-31.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
147	<i>I. p. pyrrhopterus</i> (2) . . . . .	27	29	28
144	<i>M. (S.) rufo-axillaris</i> (2) . . . . .	—	—	41
141	<i>A. albirostris</i> (3) . . . . .	36,6	47	41,2
149	<i>I. croconotus</i> (1) . . . . .	—	—	50
145	<i>L. m. superciliaris</i> (2) . . . . .	49	52	50,5
142	<i>A. b. badius</i> (12) . . . . .	43	62	53,3
148	<i>G. ch. chopi</i> (3) . . . . .	51	65	58,6
143	<i>M. b. bonariensis</i> (13) . . . . .	59	62	61,7
146	<i>T. m. militaris</i> (2) . . . . .	110	117	113,5

#### Familia **Corvidae** (Urracas).

150) **Cyanocorax ch. chrysops** (Vieill.) « urraca » o « cucarra ».

9 ejem. de Zapla, VI-28; 8 de Río Lavayén, VII-29; 1 de El Atalaya, IX-29; 2 de Río de Los Sauces, VI-30; 1 de La Escalera. VIII-31.

Nº	Especie	p. mín.	p. máx.	p. t/m
150	<i>C. ch. chrysops</i> (21) . . . . .	154	170	166

**CUADRO POR ORDEN CRECIENTE DEL PESO DE TODAS  
LAS ESPECIES ESTUDIADAS**

Nº	E s p e c i e	P. t/m Grs.	Nº	E s p e c i e	P. t/m Grs.	
56	Talaphorus chionogaster . . . . .	3,8	77	Cinelodes fuscus tucuma-		
58	Heliomaster furcifer . . . . .	5,5	nus . . . . .	27,6		
57	Lesbia sparganura . . . . .	5,5	147	Icterus p. pyrrhopterus . . . . .	28,	
96	Euscarthmornis m. marga-		115	Atlapetes fulviceps . . . . .	28,2	
	ritaceiventer . . . . .	7,	88	Xolmis i. irupero . . . . .	28,3	
112	Compsothlypis p. pitiayumi	7,	104	Muscivora tyrannus . . . . .	28,5	
126	Spinus ictericus . . . . .	7,7	97	Suiriri suiriri . . . . .	28,6	
95	Serpophaga nigricans . . . . .	8,	135	Phrygilus alaudinus . . . . .	28,8	
114	Myioborus brunneiceps . . . . .	9,	103	Tyrannus m. melancholicus	29,2	
122	Poospiza melanoleuca . . . . .	9,	118	Piranga flava Azarae . . . . .	30,	
121	Sporophila caerulescens . . . . .	10,	90	Satrapa icterophrys . . . . .	30,5	
99	Pyrocephalus r. rubinus . . . . .	10,5	106	Phaeoprogne tapera . . . . .	31,	
80	Siptornis p. pyrrhophius . . . . .	13,	116	Thraupis bonariensis . . . . .	31,	
93	Lessonia rufa oreo . . . . .	13,	137	Phrygilus fruticeti . . . . .	30,5	
79	Siptornis modesta . . . . .	14,	76	Upucerthia v. validirostris	32,5	
131	Poospiza erythrophrys . . . . .	14,1	67	Trichopieus caetorum . . . . .	33,	
127	Sicalis a. larvensis . . . . .	15,3	130	Zonotrichia strigiceps Dab-		
138	Phrygilus plebeius . . . . .	15,3	benei . . . . .	34,		
128	Sicalis flaveola Pelzelni . . . . .	15,8	78	Phloeoceryptes melanops . . . . .	35,	
139	Coryphospingus c. cuculla-		102	Empidonomus a. a. c. au-		
	tus . . . . .	16,7	rantio-atro cristatus . . . . .	35,2		
133	Poospiza Whitii . . . . .	17,	69	Veniliornis olivinus fron-		
113	Basileuterus auricapillus . . . . .	17,5	talis . . . . .	38,		
89	Ochthoeca o. oenanthoides	19,2	86	Lepidocolaptes a. angusti-		
55	Micropus andecolus Dinellii	20,	rostris . . . . .	40,		
91	Knipolegus a. aterrimus . . . . .	21,6	82	Phacellodomus s. striati		
74	Rhopochares ruficapillus . . . . .	21,6	ceps . . . . .	40,		
140	Arremon flavirostris D'Or-		144	Molothrus (Streptopvagus)		
	bignyi . . . . .	22,1	rufo-axillaris . . . . .	41,		
124	Pseudochloris olivaceus		117	Thraupis sayaca . . . . .	41,	
	sordida . . . . .	22,8	141	Archiplanos albirostris . . . . .	41,2	
83	Xenotistes r. rufosuperci-		111	Mimus triurus . . . . .	42,	
	liatus . . . . .	23,	52	Chloroceryle americana . . . . .	43,	
92	Muscisaxicola cinerea . . . . .	23,6	75	Furnarius r. rufus . . . . .	43,7	
81	Phacellodomus rufifrons		134	Embernagra olivascens . . . . .	45,5	
	sincipitalis . . . . .	24,	12	Columbina picui . . . . .	47,	
136	Phrygilus atriceps . . . . .	24,	71	Bucco maculatus striati-		
129	Brachyspiza capensis . . . . .	24,3	pectus . . . . .	47,		
123	Pseudochloris aureiventris		53	Hidropsalis torquata fur-		
	Mendozae . . . . .	24,5	cifera . . . . .	47,		
101	Myiarchus ferox australis	25,	119	Saltator a. aurantiostris	47,	
100	Sayornis nigricans latiros-		60	Tapera naevia . . . . .	50,	
	tris . . . . .	25,7	149	Icterus croconotus . . . . .	50,	
94	Machetornis r. rixosa . . . . .	27,	145	Leistes militaris superci-		
125	Cyanocompsa cyanea ar-		liaris . . . . .	50,5		
	gentina . . . . .	27,5				

Nº	Especie	P. t/m Grs.
87	Agriornis montana maritima . . . . .	52,
142	Molothrus badius . . . . .	53,3
122	Pheucticus aureo-ventris . . . . .	55,
73	Taraba m. major . . . . .	58,6
148	Gnorimopsar ch. chopi . . . . .	58,6
43	Glaucidium nanum . . . . .	59,
120	Saltator c. caerulescens . . . . .	59,2
109	Mimus modulator . . . . .	60,
9	Metriopelia aymara . . . . .	61,
48	Amoropsittaca aymara . . . . .	61,
143	Molothrus b. bonariensis . . . . .	61,7
64	Chloronerpes rubiginosus . . . . .	62,8
25	Steganopus tricolor . . . . .	65,
98	Pitangus sulphuratus bolivianus . . . . .	67,6
68	Veniliornis olivinus . . . . .	73,
85	Xiphocolaptes emigrans . . . . .	74,
108	Planesticus r. rufiventris . . . . .	74,3
105	Phytotoma r. rutila . . . . .	77,3
47	Pyrrhura M. Molinae . . . . .	78,
110	Mimus patagonicus . . . . .	80,
107	Planesticus anthracinus . . . . .	93,3
10	Metriopelia melanoptera . . . . .	100,
66	Leuconerpes candidus . . . . .	105,
59	Piaya cayana macroura . . . . .	112,
23	Phinocorys Orbignyianus . . . . .	112,5
146	Trupialis m. militaris . . . . .	113,5
62	Guira guira . . . . .	114,
65	Chrysophilus m. melanolaemus . . . . .	122,
50	Falco sparverius eidos . . . . .	124,
61	Crotophaga ani . . . . .	127,
11	Zenaida a. auriculata . . . . .	128,
41	Otus ch. choliba . . . . .	152,
84	Xiphocolaptes m. major . . . . .	157,4
26	Butorides s. striatus . . . . .	162,
16	Pardirallus rufirhynchus . . . . .	162,
150	Cyanocorax ch. chrysops . . . . .	166,
63	Colaptes rupicola . . . . .	167,
13	Leptotila ochroptera chlo-roauchenia . . . . .	172,
45	Thectocercus ac. acuticaudatus . . . . .	174,

Nº	Especie	P. t/m Grs.
54	Nyctibius griseus griseus . . . . .	180,
18	Ionornis martinica . . . . .	200,
42	Speotyto c. cunicularia . . . . .	200,
1	Crypturus tataupa . . . . .	202,
14	Picazuro picazuro venturiana . . . . .	212,5
6	Nothura maculosa . . . . .	240,
24	Ptiloscelis resplendens . . . . .	240,
44	Ara mitratus . . . . .	247,
70	Scapanus leucopogon . . . . .	249,
50	Amazona tucumana . . . . .	260,
51	Streptoceryle torquata . . . . .	291,
4	Nothoprocta Pentlandi . . . . .	300,
15	Chloroenas albilinia . . . . .	322,
39	Falco f. c. fusco-caerulescens . . . . .	385,
19	Fulica ardesiaca . . . . .	400,
38	Rupornis magnirostris . . . . .	400,
17	Gallinula chloropus galeata . . . . .	417,
27	Plegadis guarana . . . . .	450,
22	Larus cirrhocephalus . . . . .	450,
49	Amazona aestiva . . . . .	470,
72	Rhamphastos toco . . . . .	523,
21	Fulica rufifrons . . . . .	560,
7	Ortalis canicollis . . . . .	620,
2	Tinamotis Pentlandi . . . . .	650,
5	Nothoprocta ornata ros-trata . . . . .	675,
36	Ibiter megalopterus . . . . .	780,
30	Eristomys ferruginea . . . . .	800,
37a	Buteo erythronotus . . . . .	820,
37b	» » . . . . .	833,
3	Rhynchotus rufescens maculicollis . . . . .	868,
35	Polyborus tharus . . . . .	880,
29	Anas specularoides alticola . . . . .	900,
20	Fulica armillata . . . . .	1040,
32	Phalacrocorax vigua . . . . .	1215,
34	Cathartes aura ruficollis . . . . .	1320,
8	Penelope obscura obscura . . . . .	1770,
31	Phoenicopterus chilensis . . . . .	1790,
28	Chloephaga melanoptera . . . . .	2037,
33	Vultur gryphus . . . . .	11250,

Jujuy, febrero, 1932.