

cede el tipo, es Patagonia, Cordillera del río Chico, basado sobre un ejemplar hembra adulta, de la colección del U. S. National Museum.

La distribución de esta forma geográfica se extiende según su autor, por la zona tropical templada, Uruguay, hasta el norte de Argentina, Tierra del Fuego, Chile y Perú.

La otra subespecie, llamada *Tyto alba subandina* está limitada en Colombia y Ecuador.

El Sr. Kelso opina que la localidad típica de *Strix tuidara* J. E. Gray, basado en *tuidara* de Marcgrave, sería Fortaleza, Ceará, Brasil, puesto que Marcgrave nunca ha visitado el sur del Brasil.

DOS PÁJAROS NUEVOS PARA LA FAUNA PARAGUAYA *

POR ANGEL R. ZOTTA

En Puerto Guaraní, localidad situada al norte del Chaco paraguayo, sobre la margen izquierda del río Paraguay, nuestro consocio el señor J. B. Daguerre ha efectuado una importante colección ornitológica, formada por 138 pieles, que remitió al Museo Argentino de C. Naturales.

Entre ellas merece destacarse dos casales, uno de *Pseudoseisura cristata unirufa* (Lafresnaye et d'Orbigny), y otro de *Dendrocolaptes picumnus pallescens* Pelzeln, no señalados en la avifauna de ese país, y que figuran en las colecciones desde 1928, con el N° 2055 a y N° 2055 b respectivamente. Los que han hecho estudios sobre la forma *P. c. unirufa*, limitan su área de dispersión hasta el río São Lourenço y Taquary en Matto Grosso y en Bolivia, hasta los Llanos de Mojos.

Por su aspecto y color, *P. c. unirufa* es muy similar a nuestro « Cacholote » *Pseudoseisura lophotes* (Reichenbach), pero de tamaño mucho más chico.

Esta subespecie es muy abundante en la región, y, según el colector, suelen andar en grupos de cinco a seis individuos.

El otro, *D. p. pallescens*, también se le conocía desde Matto Grosso hasta Santa Cruz y Tarija en Bolivia y NW. de Argentina, en Salta y Jujuy. Esta especie, es como la anterior, común en esa zona del Paraguay.

* Hemos consultado al Dr. A. de W. Bertoni, al agregar estas dos aves a la avifauna del Paraguay.