

LISTA DE AVES URUGUAYAS

POR

JUAN TREMOLERAS

(MONTEVIDEO)

La presente lista es el resultado de treinta años de investigaciones ocasionales sobre la avifauna uruguaya. Para su redacción me he valido de una colección de aves capturadas y preparadas por mí desde 1888 a 1891 (que llegó a alcanzar a unas ciento cincuenta especies), y de numerosos ejemplares que, ulteriormente, he tenido oportunidad de cazar y observar durante mis excursiones por varias regiones del país.

Las procedencias que menciono se refieren siempre a los departamentos de la República y no a sus capitales, que suelen llevar el mismo nombre que aquéllos. Se observará que en esta enumeración cito con mayor frecuencia los departamentos del sur, este y nordeste del país. Esto se debe a que casi todos mis viajes los he llevado a cabo por dichas regiones. Cuando cito "Uruguay" como procedencia, lo hago porque no he tenido oportunidad de conocer ejemplares de la especie respectiva en nuestro territorio, en cuyo caso me apoyo en el testimonio de autores fidedignos.

He añadido los nombres vulgares a los científicos para cierto número de especies, siempre que los primeros hayan sido consagrados por el uso entre cazadores, aficionados a aves y habitantes de la campaña. En casos de duda sobre la especie a la cual debía adscribirse el respectivo nombre vernacular, he preferido omitirlo.

Calculo que la cantidad de especies, subespecies y variedades de nuestra ornithofauna aumentará casi en un tercio más el número de las comprendidas en esta lista, una vez que el país haya sido explorado científicamente, sobre todo en lo que se refiere a los departamentos del extremo norte y orilla del río Uruguay.

Parece superfluo decir que el presente trabajo no está quizás exento de errores y omisiones, por otra parte inevitables en quien, como el autor, sólo dispone de algún tiempo que roba a sus contados momentos de descanso para contribuir de manera modesta, pero desinteresada, al conocimiento de la fauna uruguaya. Más adelante publicará las adiciones y correcciones a que haya lugar, siempre que no se adelanten (como es de desear) quienes, en el país, tienen el deber moral y material de aportar su contingente a la obra común.

Finalmente, séame permitido presentar mis agradecimientos a nuestro caro Presidente, el distinguido ornitólogo doctor Roberto Dabbene, por la determinación de varias especies y la revisión de la presente lista, así como al señor Pedro Serié por la corrección de pruebas de la misma.

ORDEN RHEIFORMES

Familia Rheidae

1. *Rhea americana* Rothschildi Brab. et Chubb. «Avestruz»; «Ñandú». — San José; Flores; Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Cerro Largo; Florida; Rocha.
Rhea americana Aplin, The Ibis, 1894, p. 214.

ORDEN TINAMIFORMES

Familia Tinamidae

2. **Rhynchotus rufescens** (Temm.). « Perdiz grande »; « Martineta ». — San José; Flores; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Rhynchotus rufescens Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (Santa Elena y Santa Florencia).
3. **Nothura maculosa** (Temm.). « Perdiz ». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Maldonado; Minas; Colonia; Florida; Durazno; Treinta y Tres; Cerro Largo; Rocha.
Nothura maculosa Aplin, The Ibis, 1894, p. 214 (Santa Elena).

ORDEN GALLIFORMES

Familia Cracidae

4. **Penelope obscura** Temm. « Pava de monte ». — Paysandú; Salto; Artigas; Minas; Treinta y Tres.

ORDEN COLUMBIFORMES

Familia Columbidae

5. **Picazurus picazuro** (Temm.) « Paloma de monte ». — Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Montevideo; Rocha.
Columba picazuro Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
6. **Notioenas maculosa** (Temm.). — Treinta y Tres; Cerro Largo; Rocha.
Columba maculosa Aplin, The Ibis, 1894, p. 201 (Río Negro, Mouzón, Arroyo Grande, Santa Elena).

Familia Peristeridae

7. **Zenaida auriculata** (Des Murs). « Torcaza »; « Paloma torcaz ». — Canelones; San José; Minas; Maldonado; Flores; Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Zenaida maculata Aplin, The Ibis, 1894, p. 202 (Santa Elena, Arroyo Grande).
8. **Columbina picui** (Temm.) « Palomita »; « Palomita de la Virgen ». — Montevideo; Canelones; Minas; Maldonado.
Columbula picui Aplin, The Ibis, 1894, p. 202 (Montevideo).
9. **Leptoptila Reichenbachi** Pelz. — Paysandú.
10. **Leptoptila ochroptera chloroauchenia** Gigl. et Salvad. — Flores; Soriano; Río Negro; Rocha.
Engyptila chalcuauchenia Aplin, The Ibis, 1894, p. 202 (Río Negro, Arroyo Grande, Santa Elena).

ORDEN RALLIFORMES

(Gallinetas)

Familia Rallidae

11. **Pardirallus maculatus** (Bodd.) — Montevideo; Canelones, Maldonado; Treinta y Tres; Cerro Largo.
12. **Pardirallus rythirhynchus** (Vieill.) — Montevideo; Canelones; Maldonado; Colonia; Rocha; Treinta y Tres.
Rallus rythirhynchus Aplin, The Ibis, 1894, p. 203 (Río Sauce).
13. **Aramides chiricote** (Vieill.) — Canelones.

14. *Aramides ypacaha* (Vieill.) — Montevideo; Canelones; Colonia.
Aramides ypecaha Aplin, The Ibis, 1894, p. 204 (Perdido).
15. *Ortygops notata* (Gould). — Durazno.
16. *Gallinula chloropus galeata* (Licht.) — Canelones; San José; Colonia.
Gallinula galeata Aplin, The Ibis, 1894, p. 204 (Monzon).
17. *Porphyriops melanops* (Vieill.) — Montevideo; Canelones; Maldonado; Rocha.
18. *Fulica armillata* Vieill. — Montevideo; Canelones; San José; Maldonado.
19. *Fulica leucoptera* Vieill. — Montevideo; Canelones; Colonia; Maldonado.
Fulica leucoptera Aplin, The Ibis, 1894, p. 205.

ORDEN PODICIPEDIFORMES

Familia Podicipedidae

20. *Podiceps americanus* Garn. — Montevideo; Canelones; Colonia.
Podiceps rollandi (nec Q. et G.) Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (Arroyo Grande).
21. *Podiceps dominicus brachyrhynchus* (Chapm.) — Montevideo; Canelones; Maldonado.
22. *Aechmophorus major* (Bodd.) — Montevideo; Canelones; Maldonado.
Aechmophorus major Aplin, The Ibis, 1894, p. 211 (Costa uruguaya).
23. *Podilymbus podiceps* (Linn.) — Montevideo.

ORDEN SPHENISCIFORMES

Familia Spheniscidae

24. *Spheniscus magellanicus* (Forster). — Costas de Montevideo, Canelones y Maldonado.
Spheniscus magellanicus Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (Maldonado).

ORDEN PROCELLARIIFORMES

Familia Procellariidae

25. *Oceanites oceanica* (Kuhl). — Costa de Maldonado.
26. *Pelagodroma marina* (Lath.) — Costa uruguaya del estuario del Plata.
Pelagodroma marina Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (cerca de la isla de Palma).

Familia Puffinidae

27. *Puffinus griseus* (Gm.). — Costa uruguaya del estuario del Plata (Aplin).
Puffinus griseus Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (Costa uruguaya).
28. *Procellaria aequinoctialis* Linn. — Costa de Montevideo, Canelones y Maldonado.
29. *Petrella capensis* (Linn.) « Paloma del Cabo ». — Costa de Maldonado.
Daption capensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 212 (Costa uruguaya).
30. *Heteropron desolatus Banksi* (Smith). — Costa de Montevideo.

Familia Diomedelidae

31. *Thalassarche melanophrys* (Temm.) « Albatros »; « Pato carnero ». — Costa de Montevideo.

ORDEN LARIFORMES

Familia Laridae

32. *Phaethusa chloropoda* (Vieill.) — Costa de Montevideo.
 33. *Thalasseus maximus* (Bodd.) — Costas de Montevideo, Canelones y Maldonado.
 34. *Sterna hirundinacea* Less. — Costas de Montevideo, Canelones. Maldonado y Rocha.
Sterna hirundinacea Aplin, The Ibis, 1894, p. 210 (Montevideo).
 35. *Sterna Trudeaui* Audub. — Costas de Montevideo, Canelones y Maldonado.
 36. *Sternula superciliaris* (Vieill.) — Costas de Colonia y Montevideo.
 37. *Rynchops intercedens* Saunders. « Rayador ». — Costa de Montevideo.
 38. *Larus cirrhocephalus* Vieill. « Gaviota ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Rocha.
Larus cirrhocephalus Aplin, The Ibis, 1894, p. 211 (Montevideo).
 39. *Larus maculipennis* Licht. « Gaviota ». — Montevideo; Canelones.
Larus maculipennis Aplin, The Ibis, 1894, p. 211 (Montevideo).
 40. *Larus dominicanus* Licht. « Gaviota cocinera ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Rocha.
Larus dominicanus Aplin, The Ibis, 1894, p. 210 (Montevideo, Santa Ana).

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Charadriidae

41. *Haematopus palliatus* Temm. — Colonia.
Haematopus palliatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
 42. *Oreophilus ruficollis* (Wagl.) — Montevideo; Canelones.
Oreophilus ruficollis Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
 43. *Belonopterus cayennensis grisescens* (Prázák). « Terutero »; « Tero ». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Colonia; Durazno; Soriano; Río Negro; Florida; Maldonado; Minas; Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Vanellus cayennensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 205.
 44. *Pluvialis dominicus* (P. L. S. Müll.) — San José; Montevideo.
Charadrius dominicus Aplin, The Ibis, 1894, p. 206.
 45. *Zonibyx modestus* (Licht.) — Montevideo; Soriano.
Eudromias modesta Aplin, The Ibis, 1894, p. 206.
 46. *Aegialitis collaris* (Vieill.) — Montevideo; Canelones; Maldonado.
Aegialitis collaris Aplin, The Ibis, 1894, p. 206 (Río Negro).
 47. *Leucopoliis (Pernettysa) falklandica* (Lath.) — Montevideo; Canelones; Colonia.
 48. *Himantopus melanurus* (Vieill.). « Terutero real »; « Tero real ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Cerro Largo.
Himantopus brasiliensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
 49. *Mesoscolopax borealis* (Forst.) — Montevideo; Colonia.
Numenius borealis Aplin, The Ibis, 1894, p. 210 (Montevideo).
 50. *Limosa haemastica* (Linn.) — Montevideo; Canelones.
 51. *Micropalama himantopus* (Bp.) — Maldonado.
 52. *Neoglottis melanoleuca* (Gm.). — Montevideo; Canelones, Maldonado.
Totanus melanoleucus Aplin, The Ibis, 1894, p. 209.
 53. *Neoglottis flavipes* (Gm.). — Montevideo; San José; Colonia; Canelones; Maldonado.

54. *Tringa solitaria* (Wils.) — San José.
Rhyacophilus solitarius Aplin, The Ibis, 1894, p. 209.
55. *Bartramia longicauda* (Bechst.) — Montevideo; Colonia.
Actiturus bartramius Aplin, The Ibis, 1894, p. 209.
56. *Calidris alba* (Pallas) — Colonia; San José; Montevideo; Canelones; Maldonado.
57. *Pisobia maculata* (Vieill.) — San José; Montevideo.
58. *Pisobia fuscicollis* (Vieill.) — Montevideo; Canelones.
59. *Gallinago paraguaiae* (Vieill.) « Becasina ». — Canelones; Florida; Maldonado; San José; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Gallinago paraguaiae Aplin, The Ibis, 1894, p. 207.
60. *Homoptilura undulata gigantea* (Temmin.) — San José.
61. *Rostratula semicollaris* (Vieill.) « Aguatero ». — Montevideo; Canelones; Treinta y Tres; Cerro Largo.

Familia **Parridae**

62. *Jacana jacana* (Linn.) — Canelones; Cerro Largo; Rocha.
Parra jacana Aplin, The Ibis, 1894, p. 205 (Río Negro).

ORDEN GRUIFORMES

Familia **Aramidae**

63. *Aramus scolopaceus carau* ⁽¹⁾ Vieill. « Carao » o « Carau ». — Canelones; Florida; Treinta y Tres; Cerro Largo.

Familia **Cariamidae**

64. *Cariama cristata* (Linn.). « Seriema » o « Sariema ». — Cerro Largo.

ORDEN ARDEIFORMES

Familia **Ardeidae**

65. *Ardea cocoi* Linn. « Garza »; « Garza mora »; « Juan Grande ». — Canelones; Maldonado; Rocha; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Ardea cocoi Aplin, The Ibis, 1894, p. 197.
66. *Casmerodius albus egretta* (Gm.) « Garza blanca ». — Maldonado; Rocha.
Ardea egretta Aplin, The Ibis, 1894, p. 198 (Santa Ana).
67. *Florida caerulea* Linn. — Cerro Largo.
Ardea caerulea Aplin, The Ibis, 1894, p. 198 (Río Negro).
68. *Egretta thula* (Mol.) « Garza blanca chica ». — Maldonado.
[= *candidissima* (Gmel.)].
69. *Nycticorax nycticorax naevius* (Bodd.) — Montevideo; Canelones; Maldonado.
Nycticorax obscurus Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Mouzon).
70. *Syrigma sibilatrix* (Temmin.) « Garza amarilla ». — Cerro Largo.
71. *Butorides striata* (Linn.) — Montevideo; Canelones.
Butorides cyanurus Aplin, The Ibis, 1894, p. 198.
72. *Ixobrychus involucris* (Vieill.) « Mirasol ». — Montevideo; Canelones; Cerro Largo.
Ardetta involucris Aplin, The Ibis, 1894, p. 199.
73. *Botaurus pinnatus* (Wagl.) — Canelones; Maldonado.

(1) Cf. Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll. LXII, N° 2, April, 1918, p. 42.

Familia Ciconiidae

74. **Tantalus americanus** (Linn.) « Cigüeña »; « Tuyuyú ». — Canelones; Maldonado; Rocha; Treinta y Tres.
Tantalus loculator Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Arroyo Grande, Río Negro).
75. **Euxenura maguari** (Gm.) « Cigüeña ». — Maldonado; Rocha; Cerro Largo.
Euxenura maguari Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Santa Elena).
76. **Mycteria mycteria** (Licht.). « Jabirú »; « Cigüeña blanca ». — Rocha; Treinta y Tres.

Familia Ibiidae

77. **Theristicus caudatus** (Bodd.) — Treinta y Tres.
78. **Molybdophanes caerulescens** (Vieill.) — Cerro Largo; Rocha.
79. **Phimosus nudifrons** Azaræ Berl. et Hart. — Uruguay.
Phimosus infuscatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 199.
80. **Plegadis guarauna** (Linn.) « Banduria ». — Canelones; Treinta y Tres; Cerro Largo.

Familia Plataleidae

81. **Ajaja ajaja** (Linn.) « Espátula »; « Garza rosada ». — Canelones; San José; Florida; Maldonado; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Ajaja rosea Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Río Negro).

ORDEN ANSERIFORMES

Familia Anatidae

82. **Cygnus melanocoryphus** (Mol.) « Cisne »; « Cisne de cuello negro ». — Canelones; Rocha; Cerro Largo.
Cygnus nigricollis Aplin, The Ibis, 1894, p. 200 (Estancia Santa Adelaida, Estancia Miguelette, Colonia).
83. **Cairina moschata** (Linn.) « Pato real »; « Pato grande ». — Montevideo; Canelones; Rocha; Treinta y Tres.
84. **Coscoroba coscoroba** (Mol.) « Ganso »; « Ganso silvestre ». — Canelones; Maldonado.
Coscoroba candida Aplin, The Ibis, 1894, p. 200 (Río Santa Lucía).
85. **Dendrocygna viduata** (Linn.) — Montevideo; Cerro Largo.
86. **Dendrocygna fulva** (Gm.) — Canelones; Cerro Largo.
Dendrocygna fulva Aplin, The Ibis, 1894, p. 200.
87. **Mareca sibilatrix** (Poeppig). — Canelones; Cerro Largo.
88. **Nettion flavirostris** (Vieill.) — Montevideo; Canelones; Cerro Largo.
Querquedula flavirostris Aplin, The Ibis, 1894, p. 200.
89. **Nettion brasiliensis** (Gm.) — Montevideo; Cerro Largo.
Querquedula brasiliensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
90. **Nettion torquatum** (Vieill.) — Cerro Largo.
Querquedula torquata Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
91. **Dafla spinicauda** (Vieill.) — Montevideo; Canelones; Rocha.
Dafla spinicauda Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
92. **Pecilonetta bahamensis** (Linn.) — Canelones.
93. **Querquedula versicolor** (Vieill.) « Patito marrueco »; « Marruequito ». — San José; Montevideo; Canelones; Maldonado; Rocha; Cerro Largo.
Querquedula versicolor Aplin, The Ibis, 1894, p. 200.

94. *Querquedula cyanoptera* (Vieill.) — Montevideo; Cerro Largo.
Querquedula cyanoptera Aplin, The Ibis, 1894, p. 200 (Las Coronas).
95. *Spatula platalea* (Vieill.) — Montevideo; Canelones.
Spatula platalea Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
96. *Heteronetta atricapilla* (Merrem). — Uruguay.
97. *Metopiana peposaca* (Vieill.) « Pato picazo ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Rocha; Cerro Largo.
Metopiana peposaca Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
98. *Oxyura vittata* (Phil.) — Montevideo.

ORDEN PHŒNICOPTERIFORMES

Familia Phœnicopteridae

99. *Phœnicopterus chilensis* Mol. « Flamenco ». — Canelones; Rocha.
Phœnicopterus ignipallatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 199 (Maldonado).

ORDEN PALAMEDEIFORMES

Familia Palamedeidae

100. *Chauna torquata* (Oken). « Chajá »; « Yajá ». — Canelones; Maldonado; Minas; Rocha; Treinta y Tres; Cerro Largo; Flores.
 [= *Chauna Salvadorii* Brab. et Chubb. (Cf. Hellmayr, Verhandl. Ornith. Gesell. Bayern, XIII; 2, Sept. 20, 1917, p. 209)].
Chauna chavaria Aplin, The Ibis, 1894, p. 200 (Río Negro).

ORDEN PELECANIFORMES

Familia Phalacrocoracidae

101. *Phalacrocorax vigua* (Vieill.). « Viguá »; « Zaramagullón ». — Colonia; San José; Montevideo; Canelones.
Phalacrocorax brasilianus Aplin, The Ibis, 1894, p. 197 (Isla de Flores, Soriano y Río Negro).

ORDEN CATHARTIDIFORMES

Familia Cathartidae

102. *Coragyps urubu foetens* (Wied.). « Cuervo ». — Minas; Florida; Flores; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Cathartes atratus Aplin, The Ibis, 1894, p. 196 (Río Negro).
103. *Cathartes aura jota* (Mol.). « Cuervo real ». — Cerro Largo.
 [= *Cathartes falplandica* Sharpe. Cf. Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard College LXII. N° 2, April 1918, p. 34].
Cathartes aura Aplin, The Ibis, 1894, p. 196 (Río Negro, Santa Elena).

ORDEN ACCIPITRIFORMES

Familia Falconidae

104. *Polyborus plancus* (Miller). « Carancho ». — Minas; Maldonado; Cerro Largo; Flores.
Polyborus tharus Aplin, The Ibis, 1894, p. 196 (Arroyo Grande).

105. **Milvago chimango** (Vieill.). «Chimango». — Canelones; Florida; Flores; San José; Maldonado; Minas; Cerro Largo.
Milvago chimango Aplin, The Ibis, 1894, p. 196 (Río Negro, Santa Florencia).
106. **Milvago chimachima** (Vieill.). — Uruguay.
107. **Circus cinereus** (Vieill.). «Gavilán». — Rivera; Cerro Largo.
108. **Circus Buffoni** (Gmel.) [= *maculosus* (Vieill.)]. — Flores.
Circus macropterus Aplin, The Ibis, 1894, p. 194.
109. **Geranoaetus melanoleucus** (Vieill.). «Aguila». — Florida; Minas.
Geranoaetus melanoleucus Aplin, The Ibis, 1894, p. 194.
110. **Buteo erythronotus** (King). — Flores; San José.
Buteo erythronotus Aplin, The Ibis, 1894, p. 194.
111. **Rostrhamus sociabilis** (Vieill.). «Halcón». — Canelones; Flores.
Rostrhamus sociabilis Aplin, The Ibis, 1894, p. 195.
112. **Elanus leucurus** (Vieill.). «Halcón blanco». — Minas; Florida; Durazno; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Elanus leucurus Aplin, The Ibis, 1894, p. 195.
113. **Falco peregrinus anatum** Bp. — Flores; San José.
Falco peregrinus Aplin, The Ibis, 1894, p. 195.
114. **Cerchneis sparverius australis** (Ridgw.). «Halconcito». — Flores; Maldonado; Minas; Florida; Durazno; Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Tinnunculus cinnamominus Aplin, The Ibis, 1894, p. 195 (Santa Elena, Las Coronas).

ORDEN STRIGIFORMES

Familia Strigidae

115. **Asio flammeus brevicaudus** ⁽¹⁾ (Schlegel). «Lechuzón». — Montevideo; Canelones; San José; Florida; Treinta y Tres.
Asio brachyotus Aplin, The Ibis, 1894, p. 193.
116. **Asio clamator midas** (Schl.). «Lechuzón». — Montevideo.
117. **Bubo virginianus nacurutu** (Vieill.). «Nacurutú». — Flores; Maldonado.
118. **Otus choliba** (Vieill.). — Florida; Canelones.
119. **Speotyto cunicularia** (Mol.). «Coruja»; «Lechuza del campo». — Montevideo; Canelones; San José; Colonia; Florida; Flores; Río Negro; Soriano; Maldonado; Minas; Rocha; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Speotyto cunicularia Aplin, The Ibis, 1894, p. 193.
120. **Tyto alba tuidara** (Gray) [= *Tyto perlata* ⁽²⁾]. «Lechuza»; «Lechuza de campanario». — Montevideo; Canelones; San José; Maldonado; Minas; Cerro Largo.

ORDEN PSITTACIFORMES

Familia Psittacidae

121. **Anodorhynchus glaucus** (Vieill.). — Uruguay.
122. **Aratinga acuticaudata** (Vieill.). — Uruguay.
123. **Aratinga leucophthalmus** (P. L. S. Müll.). «Lorito». — Flores; Río Negro; Paysandú.
Conurus leucophthalmus Aplin, The Ibis, 1894, p. 191 (Río Negro).

(1) Cf. Bangs, Proc. New Engl. Zool. Cl., VI, 1919, p. 96.

(2) Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp. Zool., LXII, N° 2, 1918, p. 52.

124. *Cyanolyseus patagonus* (Vieill.). « Loro barranquero ». — San José.
 125. *Pyrrhura vittata chiripepe* (Vieill.). « Periquito ». — Rocha; Treinta y Trés; Cerro Largo; Rivera.
 126. *Myiopsitta monacha* (Bodd.). « Cotorra ». — Minas; Maldonado; Rocha; Treinta y Trés; Cerro Largo; Tacuarembó; Durazno; Flores; Florida. *Bolborhynchus monachus* Aplin, The Ibis, 1894, p. 192 (Río Negro, Santa Adelaida).
 127. *Amazona pretrei* (Temm.). — Uruguay.

ORDEN CORACIIFORMES

Familia Halcyonidae

(Martín Pescadores)

128. *Streptoceryle torquata cyanea* (Vieill.). — Río Negro; Paysandú. *Ceryle torquata* Aplin, The Ibis, 1894, p. 190 (Arroyo Grande, Santa Elena).
 129. *Chloroceryle amazona* (Lath.). — Montevideo; Canelones; Florida; Minas; Treinta y Tres; Cerro Largo. *Ceryle amazona* Aplin, The Ibis, 1894, p. 191 (Santa Ana, Santa Elena).
 130. *Chloroceryle americana viridis* (Vieill.). — Montevideo; Canelones; Flores; Minas; Cerro Largo. *Ceryle americana* Aplin, The Ibis, 1894, p. 191.

Familia Caprimulgidae

(Dormilones)

131. *Podager nacunda* (Vieill.). — Canelones; Flores; Río Negro; Maldonado. *Podager nacunda* Aplin, The Ibis, 1894, p. 186 (Santa Elena).
 132. *Hydropsalis torquatus* (Gm.). — Montevideo.
 133. *Hydropsalis furcifer* (Vieill.). — Montevideo; Flores; Minas; Maldonado. *Hydropsalis furcifera* Aplin, The Ibis, 1894, p. 188 (Arroyo Grande).

Familia Trochilidae

134. *Hylocharis ruficollis* (Vieill.). « Picaflor ». — Montevideo.
 135. *Chlorostilbon aureoventris egregius* Heine. « Picaflor »; « Tente-en-el-aire »; « Tente ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; San José; Flores; Soriano; Florida; Treinta y Tres. *Chlorostilbon splendidus* Aplin, The Ibis, 1894, p. 185 (Santa Elena).
 136. *Helimaster furcifer* (Shaw). « Picaflor ». — Flores; Soriano. *Calliperidia furcifera* Aplin, The Ibis, 1894, p. 185.

ORDEN TROGONIFORMES

Familia Trogonidae

137. *Trogonurus surrucura* (Vieill.). — Uruguay.

ORDEN CUCULIFORMES

Familia Cuculidae

138. *Piaya cayana macroura* Gambel. — Montevideo; Minas.
 139. *Guira guira* (Gm.). « Pirineho »; « Urraca ». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Florida; Durazno; Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Cerro Largo; Rocha. *Guira piririgua* Aplin, The Ibis, 1894, p. 191.

ORDEN PICIFORMES

Familia **Picidae**

(Picapalos, Carpinteros)

140. **Soroplex campestris** (Vieill.). — Canelones.
 141. **Soroplex campestroides** (Malh.). — Canelones; Flores; Florida; Minas; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Colaptes agricola Aplin, The Ibis, 1894, p. 189 (Santa Elena, Santa Adelaida).
 142. **Chloronerpes aurulentus** (Temm.). — Paysandú; Salto.
 143. **Chrysoptilus melanolaemus** (Malh.). — Canelones; Florida; Cerro Largo.
Chrysoptilus cristatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 189.
 144. **Leuconerpes candidus** (Otto). — Paysandú; Cerro Largo.
 145. **Trichopicus cactorum** (Lafr. et Orb.). — Uruguay.
 146. **Dytiopicus mixtus** (Bodd.) — Uruguay.
 147. **Veniliornis spilogaster** (Wagl.). — Uruguay.
 148. **Scapanus leucopogon** (Valenc.). — Paysandú.
Campephilus boiei Aplin, The Ibis, 1894, p. 189 (Santa Florencia).

ORDEN PASSERIFORMES

Familia **Formicariidae**

149. **Erionotus caerulescens** (Vieill.). — Uruguay.
 150. **Erionotus gilvigaster** (Pelz.). — Uruguay.
Thamnophilus caerulescens Aplin (1), The Ibis, 1894, p. 185 (Arroyo Grande, Santa Elena).
 151. **Rhopocharus ruficapillus** (Vieill.). — Montevideo; Canelones; Colonia.
Thamnophilus ruficapillus Aplin, The Ibis, 1894, p. 185.

Familia **Dendrocolaptidae**

152. **Geositta cunicularia** (Vieill.). « Corre-caminos ». — Maldonado; Canelones; San José; Flores.
Geositta cunicularia Aplin, The Ibis, 1894, p. 181.
 153. **Furnarius rufus** (Gm.). « Hornero ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; San José; Colonia; Flores; Florida; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Furnarius rufus Aplin, The Ibis, 1894, p. 181.
 154. **Cinclodes fuscus** (Vieill.). — Montevideo; Canelones; Maldonado.
Cinclodes fuscus Aplin, The Ibis, 1894, p. 182.
 155. **Lochmias nematura** (Licht.). — Montevideo; Canelones.
 156. **Phloeocryptes melanops** (Vieill.). « Junquero ». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Maldonado; Rocha.
Phloeocryptes melanops Aplin, The Ibis, 1894, p. 182.
 157. **Leptasthenura platensis** Reichenb. — Durazno; Flores.
Leptasthenura aegithaloides Aplin, The Ibis, 1894, p. 182.
 158. **Synallaxis frontalis** Pelz. — Montevideo; Canelones.
 159. **Synallaxis ruficapilla** Vieill. — Canelones.
 160. **Synallaxis spixi** Sel. — Uruguay.
 161. **Schoeniophylax phryganophila** (Vieill.). — Montevideo; Colonia.

(1) Cf. Hellmayr, Abbandl. K. Bayer, Akad. Wiss., XXII, p. 661, 1906.

162. *Asthenes striaticeps heterocerca* (Berl. et Leverk.).—Río Negro; Paysandú.
Synallaxis striaticeps Aplin, The Ibis, 1894, p. 182.
163. *Asthenes anthoides Hudsoni* (Sel.).—Uruguay.
Synallaxis hudsoni Aplin, The Ibis, 1894, p. 182 (Santa Ana).
164. *Anumbius anumbi* (Vieill.). «Espinero»; «Chinchibirri».—Montevideo; Canelones; San José; Maldonado; Florida; Flores; Minas; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Anumbius acuticaudatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 183.
165. *Thryolegus curvirostris* (Gould).—Uruguay.
166. *Phaceloscenus striaticollis* (Lafr. et Orb.).—Uruguay.
Phacelodomus striaticollis Aplin, The Ibis, 1894, p. 183.
167. *Pseudoseisura lophotes* (Reichenb.). «Hornero grande»; «Caserote».—Río Negro; Paysandú.
Homorus lophotes Aplin, The Ibis, 1894, p. 184 (Santa Elena, Santa Adelaida, Arroyo Grande).
168. *Xenicopsis rufosuperciliatus oleagineus* Sel.—Paysandú.
169. *Picolaptes angustirostris* (Vieill.).—Uruguay.
Picolaptes angustirostris Aplin, The Ibis, 1894, p. 184 (Río Negro).
170. *Drymornis Bridgesi* (Eyton).—Canelones; Paysandú.

Familia **Tyrannidae**

171. *Myiotheretes rufiventris* (Vieill.).—Colonia; Flores; Río Negro.
Myiotheretes rufiventris Aplin, The Ibis, 1894, p. 175.
172. *Taenioptera cinerea* (Vieill.). «Escarchero».—Canelones; Minas; Florida; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Taenioptera nengeta Aplin, The Ibis, 1894, p. 175 (Arroyo Grande, Santa Elena, Paso de Navarro, Río Negro).
173. *Taenioptera coronata* (Vieill.).—Canelones; Florida; Río Negro.
174. *Taenioptera dominicana* (Vieill.).—Canelones; Minas; Cerro Largo.
Taenioptera dominicana Aplin, The Ibis, 1894, p. 176.
175. *Taenioptera irupero* (Vieill.). «Viudita».—Canelones; Florida; Flores; Minas; Cerro Largo.
Taenioptera irupero Aplin, The Ibis, 1894, p. 176 (Santa Elena).
176. *Alectrurus tricolor* (Vieill.).—Uruguay.
177. *Alectrurus risorius* (Vieill.).—Paysandú; Flores.
Alectrurus risorius Aplin, The Ibis, 1894, p. 177.
178. *Sisopygis icterophrys* (Vieill.). «Amarillo».—Montevideo; Canelones; Florida; San José; Colonia.
Sisopygis icterophrys Aplin, The Ibis, 1894, p. 177 (Santa Elena).
179. *Knipolegus cyanirostris* (Vieill.).—Uruguay.
Knipolegus cyanirostris Aplin, The Ibis, 1894, p. 177 (Arroyo Grande, Santa Elena).
180. *Lichenops perspicillata* (Gm.). «Pico de plata»; «Viudita».—Montevideo; Canelones; Minas; Maldonado.
Lichenops perspicillatus Aplin, The Ibis, 1894, p. 177.
181. *Machetornis rixosa* (Vieill.). «Picamata»; «Margarita»; «Feliz pecho».—Montevideo; Canelones; Maldonado; Colonia; San José; Minas.
Machetornis rixosa Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
182. *Lessonia nigra* (Bodd.).—Montevideo; Canelones; San José.
Centrites niger Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
183. *Hemitriccus diops* (Temmin.).—Uruguay.

184. *Hapalocercus flaviventris* (Lafr. et Orb.). — Montevideo; Canelones.
185. *Polystictus pectoralis minima* (Gould). — Uruguay.
Habrua pectoralis Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
186. *Serpophaga subcristata* (Vieill.). « Tiqui-tiqui »; « Piojito ». — Montevideo; Canelones; Flores; Colonia; San José; Río Negro.
Serpophaga subcristata Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
187. *Serpophaga nigricans* (Vieill.). — Montevideo; Canelones.
Serpophaga nigricans Aplin, The Ibis, 1894, p. 178.
188. *Tachuris* ⁽¹⁾ *rubrigastra* (Vieill.). « Siete colores ». — Montevideo; Canelones; Florida.
Cyanotis azarae Aplin, The Ibis, 1894, p. 179 (Santa Ana).
189. *Elaenia parvirostris* Pelz. — Montevideo; Canelones.
Elaenia albiceps Aplin, The Ibis, 1894, p. 179 (Santa Elena). Cf. Berlepsch. Proc. fourth Intern. Ornith. Congress Lond. 1905 (1907), p. 413.
190. *Empidagra suiriri* (Vieill.). — Montevideo; Canelones; Colonia; Río Negro.
191. *Pitangus sulphuratus bolivianus* (Lafr.). « Bienteveo ». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Colonia; Maldonado; Minas; Treinta y Tres; Cerro Largo; Río Negro; Paysandú.
Pitangus bolivianus Aplin, The Ibis, 1894, p. 179.
192. *Myiodynastes solitarius* (Vieill.). — Paysandú; Río Negro; Colonia.
193. *Myiophobus fasciatus* (P. L. S. Müll.) — Montevideo; Canelones; Florida.
Myiobius naevius Aplin, The Ibis, 1894, p. 179.
194. *Pyrocephalus rubinus* (Bodd.). « Churrinche ». — Montevideo; Canelones; Florida; Flores; Colonia; San José.
Pyrocephalus rubineus Aplin, The Ibis, 1894, p. 180 (Montevideo, Santa Elena).
195. *Myiarchus ferox ferocior* Cab. — Paysandú; Cerro Largo.
Myiarchus ferox Aplin, The Ibis, 1894, p. 180 (Río Negro).
196. *Tyrannus melancholicus* Vieill. « Bienteveo real ». — Colonia; San José; Flores; Río Negro.
Tyrannus melancholicus Aplin, The Ibis, 1894, p. 180.
197. *Muscivora tyrannus* (Linn.). « Tijereta ». — Montevideo; Canelones; San José; Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Milvulus tyrannus Aplin, The Ibis, 1894, p. 180 (Santa Elena).

Familia Cotingidae

198. *Pachyrhamphus polychropterus notius* Brewst. et Bangs. — Montevideo; *Erismatura ferruginea* (nec Eyton) Aplin, The Ibis, 1894, p. 201.
Pachyrhamphus polychropterus Aplin, The Ibis, 1894, p. 181 (Río Negro).

Familia Turdidae

199. *Planesticus amaurochalinus* (Cab.). « Sabiá » (« Sabiá blanco » en la frontera brasileña); « Hachea » o « Achea ». — Montevideo; Canelones; Florida; Flores; Colonia; Minas; Cerro Largo; Treinta y Tres.
Turdus leucomelas Aplin, The Ibis, 1894, p. 161 (Río Negro, Santa Elena).
200. *Planesticus rufiventris* (Vieill.). « Zorzal » (« Sabiá en la frontera brasileña »). — San José; Colonia; Flores; Florida; Canelones; Maldonado; Minas; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Turdus rufiventris Aplin, The Ibis, 1894, p. 161 (Río Negro, Arroyo Grande).

(1) Cf. Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp. Zool., Harvard Coll. LXIII, 1919, p. 32.

Familia Troglodytidae

201. *Troglodytes musculus bonariae* Hellm. ⁽¹⁾. «Ratonera»; «Tacuarita». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Colonia; Maldonado; Florida. *Troglodytes furvus* Aplin, The Ibis, 1894, p. 163.

Familia Mimidae

202. *Mimus modulator* (Gould). «Calandria». — Canelones; San José; Colonia; Flores; Florida; Durazno; Maldonado; Minas; Treinta y Tres; Cerro Largo; Río Negro; Paysandú; Tacuarembó.
Mimus modulator Aplin, The Ibis, 1894, p. 162.
203. *Mimus triurus* (Vieill.). «Calandria». — Canelones; Flores.

Familia Sylviidae

204. *Polioptila dumicola* (Vieill.). «Azulejo». — Canelones; Montevideo. *Polioptila dumicola* Aplin, The Ibis, 1894, p. 163.

Familia Motacillidae

205. *Anthus correndera* Vieill. «Cachila». — Montevideo; Canelones; San José; Florida; Maldonado.
Anthus correndera Aplin, The Ibis 1894, p. 165.

Familia Mniotiltidae

206. *Compsothlypis pitiayumi* (Vieill.). — San José; Flores; Cerro Largo. *Parula pitiayumi* Aplin, The Ibis, 1894, p. 165 (Río Negro).
207. *Geothlypis aequinoctialis cucullata* (Lath.). — Montevideo; Canelones; San José; Flores.
Geothlypis velata Aplin, The Ibis, 1894, p. 165 (Santa Ana).

Familia Vireonidae

208. *Cyclarhis ochrocephala* Tschudi. «Juan Chiviro». — Canelones; San José; Flores.
Cyclarhis ochrocephala Aplin, The Ibis, 1894, p. 165 (Arroyo Grande, Río Negro).

Familia Hirundinidae

(Golondrinas)

209. *Tachycineta leucorrhoa* (Vieill.). — Montevideo; Colonia; San José; Flores. *Tachycineta leucorrhoa* Aplin, The Ibis, 1894, p. 166 (Montevideo).
210. *Progne chalybea domestica* (Vieill.). — Montevideo; Canelones; San José; Colonia; Río Negro; Rocha.
211. *Progne furcata* Baird. — Montevideo; Canelones; San José. *Progne furcata* Aplin, The Ibis, 1894, p. 165.
212. *Phaeoprogne tapera* (Linn.). — Canelones. *Progne tapera* Aplin, The Ibis, 1894, p. 166.
213. *Pygochelidon cyanoleuca patagonica* (Lafr. et Orb.). — Montevideo; Colonia; Flores; Río Negro. *Atticora cyanoleuca* Aplin, The Ibis, 1894, p. 165.
214. *Alopochelidon fucatus* (Temm.). — Uruguay. *Atticora fucata* Aplin, The Ibis, 1894, p. 167 (Cuchilla Grande).

(1) Anzeiger Ornith. Gesell. in Bayern, Nº 1, 1919, p. 2.

Familia **Tanagridae**

215. **Tanagra aureata** ⁽¹⁾ Vieill. [= *Euphonia nigricollis* (Vieill.) 1819 y *Tanagra cyanocephala* Vieill. 1819]. — Uruguay.
216. **Pipraeidea melanonota** (Vieill.). — Canelones; Florida.
217. **Tangara pretiosa** (Cab.). — Rocha; Cerro Largo.
218. **Stephanophorus diadematus** (Mikan). « Cardenal azul »; « Cardenal de la patria »; « Cardenal de la sierra ». — Minas; Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Stephanophorus leucocephalus Aplin, The Ibis, 1894, p. 167 (Río Negro).
219. **Thraupis sayaca** (Linn.). — Uruguay.
220. **Thraupis bonariensis** (Gm.). « Naranjero »; « Siete colores ». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Florida; Cerro Largo.
Tanagra bonariensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 168 (Río Negro).
221. **Piranga flava** (Vieill.). — Río Negro; Paysandú; Salto.

Familia **Fringillidae**

222. **Cyanoloxia glaucocaerulea** (D'Orb. et Lafr.). — San José; Flores; Río Negro.
Guiraca glaucocaerulea Aplin, The Ibis, 1894, p. 168.
223. **Saltator aurantiirostris** Vieill. — Río Negro.
Saltator aurantiirostris Aplin, The Ibis, 1894, p. 168.
224. **Stelgidostomus maxillosus** (Cab.). — Uruguay.
225. **Sporophila hypoxantha** Cab. — Uruguay.
226. **Sporophila pileata** Sel. — Uruguay.
227. **Sporophila caerulescens** (Vieill.). « Gargantillo » o « Gargantilla »; « Corbatita ». — Montevideo; Canelones; San José; Flores; Río Negro.
Spermophila caerulescens Aplin, The Ibis, 1894, p. 168.
228. **Spinus ictericus** (Licht.). « Jilguero »; « Cabecita negra ». — Montevideo; Canelones; Colonia; San José; Florida.
Chrysomitris icterica Aplin, The Ibis, 1894, p. 170.
229. **Sicalis pelzelni** Sel. « Dorado »; « Canario ». — Montevideo; Canelones; Florida; Maldonado; Minas.
Sycalis pelzelni Aplin, The Ibis, 1894, p. 171.
230. **Sicalis arvensis** (Kittl.). « Mixto » o « Misto ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; San José; Colonia; Flores.
Sycalis luteola Aplin, The Ibis, 1894, p. 171.
231. **Brachyspiza capensis** (P. L. S. Müll.). « Chingolo ». — Maldonado; Canelones; San José; Colonia; Flores; Florida; Maldonado; Minas; Rocha; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Zonotrichia pileata Aplin, The Ibis, 1894, p. 169.
232. **Poospiza nigrorufa** (Lafr. et Orb.). « Siete vestidos ». — Montevideo; Canelones; Flores.
Poospiza nigrorufa Aplin, The Ibis, 1894, p. 169.
233. **Myospiza humeralis** ⁽²⁾ (Bosc). « Chingolo de tierra ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Flores; San José.
Coturniculus peruanus Aplin, The Ibis, 1894, p. 170.
234. **Embernagra platensis poliocephala** (Gray). « Cotorra (!) de bañado ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Flores.
Embernagra platensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 170.

(1) Cf. Bangs and Penard, Bull. Mus. Comp. Zool., LXIII, N° 2, 1919, p. 34.

(2) Cf. Menegaux, Revue Franç. d'Ornith., N° 98, 1917, p. 87.

235. *Coryphospiza albifrons* (Vieill.) — Uruguay.
Donacospiza albifrons Aplin, The Ibis, 1894, p. 169.
236. *Coryphospingus cucullatus araguira* (Vieill.) — Montevideo; Canelones.
237. *Paroaria cristata* (Bodd.) [= *Paroaria cucullata* aut.] « Cardenal ». — Canelones; Minas; Maldonado; San José; Flores; Florida; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Paroaria cucullata Aplin, The Ibis, 1894, p. 168 (Santa Elena).
238. *Gubernatrix cristata* (Vieill.) « Cardenal amarillo ». — Canelones; Minas.
Gubernatrix cristatella Aplin, The Ibis, 1894, p. 169 (Arroyo Grande, Arroyo Ojosmin).

Familia Icteridae

239. *Cacicus chrysopterus* (Vig.) « Boyero ». — Flores; Soriano; Río Negro.
240. *Amblycercus solitarius* (Vieill.) « Boyero grande »; « Boyero ». — Soriano; Río Negro.
Amblycercus solitarius Aplin, The Ibis, 1894, p. 171 (Río Negro).
241. *Molothrus bonariensis* (Gm.) « Tordo ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Minas; Colonia; Flores; San José; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Molothrus bonariensis Aplin, The Ibis, 1894, p. 172.
242. *Molothrus brevisrostris* (D'Orb. et Lafr.) — Canelones; Maldonado.
Molothrus rufoaxillaris Aplin, The Ibis, 1894, p. 172 (Santa Elena, Santa Ana).
243. *Molothrus badius* (Vieill.) « Música »; « Tordo mulato ». — Montevideo; Canelones; Florida; Maldonado; Cerro Largo.
Molothrus badius Aplin, The Ibis, 1894, p. 172.
244. *Agelaius thilius chrysocarpus* (Vig.) « Alferez ». — Montevideo; Canelones; Maldonado; Flores.
Agelaius thilius Aplin, The Ibis, 1894, p. 173.
245. *Agelaius flavus* (Gm.) — Cerro Largo; Rocha.
Agelaius flavus Aplin, The Ibis, 1894, p. 173.
246. *Agelaius ruficapillus* Vieill. — Canelones.
247. *Leistes militaris superciliaris* (Bp.) « Pecho colorado chico ». — Canelones; Flores; San José.
248. *Amblyramphus holosericeus* (Scop.) « Federal ». — Treinta y Tres; Rocha; Cerro Largo.
Amblyramphus holosericeus Aplin, The Ibis, 1894, p. 173 (Santa Ana, Arroyo Grande, Santa Elena).
249. *Pseudoleistes virescens* (Vieill.) « Pecho amarillo »; « Dragón ». — Canelones; Minas; Maldonado; Treinta y Tres; Cerro Largo.
Pseudoleistes virescens Aplin, The Ibis, 1894, p. 173.
250. *Trupialis Defilippii* Bp. « Pecho colorado ». — Canelones; Flores; San José; Cerro Largo.
Trupialis defilippii Aplin, The Ibis, 1894, p. 174 (Río Negro).
251. *Xanthornus pyrrhopterus* (Vieill.) — Canelones; Paysandú.
252. *Gnorimopsar chopi* (Vieill.) « Charrúa ». — Río Negro; Paysandú.

Familia Corvidae

253. *Cyanocorax chrysops* (Vieill.) « Urraca ». — Salto.
Cyanocorax chrysops Aplin, The Ibis, 1894, p. 174 (Arroyo Grande, Paso de los Loros, Río Negro).
254. *Cyanocorax cyanomelas* (Vieill.) — Uruguay.

Aplin (Birds of Uruguay, in The Ibis 1894, pp. 149-214), cita además las siguientes especies encontradas por él:

Crax Sclateri Gray. — Aplin, l. c. p. 203 (Río Negro).

Fulica rufifrons Phil. et Landb. — Aplin, l. c. p. 204 (*Fulica leucopyga*).

Pisobia Bairdi (Coues). — Aplin, l. c. p. 209 (Sauce).

Caprimulgus parvulus Gould. — Aplin, l. c. p. 188 (*Anthrostomus parvulus*), (Río Negro).

Darwin señaló también:

Limnornis rectirostris Gould. — Maldonado.

Y, en fin, Rothschild y Chubb (Novit. Zoolog., XXI, N° 2, 1914), han descrito una nueva forma de *Rhea*, procedente de Barra San Juan, Colonia, con el nombre de *Rhea americana intermedia*.

BREVES NOTAS SOBRE LAS AVES ANTÁRTICAS (1)

POR

A. G. BENNETT, M.A.S.O.P.

PORT STANLEY (MALVINAS)

Los siguientes apuntes han sido reunidos por mí, durante una estadía en las islas Shetland del Sur, durante los años 1913-14 y 1917-19, y en las islas Orcadas del Sur, en los años 1914-15.

Sterna hirundinacea Less. "Gaviotín de lomo blanco". — La distribución de esta especie se extiende desde Bahía, en el Brasil, y Chimbote en el Perú, hasta las tierras antárticas. Es bastante común y hasta abunda en algunas regiones. Se reproduce en las islas Shetland del Sur, Orcadas del Sur y en las islas Malvinas (Falkland). Llega a esas regiones en el mes de Noviembre, para emigrar en Abril. Su alimento consiste principalmente en pequeños peces y crustáceos del plankton, que recoge zambulléndose, no dejando de perseguir su presa aun cuando el mar está agitado. Su vuelo es rápido y elegante, y realzan aun más las gracias de esta ave, la coloración de su plumaje gris perla sobre el dorso, con la parte superior de la cabeza negra, el vientre blanco y el pico y las patas rojo de sangre. En el suelo, sin embargo, es muy torpe para caminar, debido a sus cortas piernas. Como sucede con varias otras especies de esta familia, la época de la postura parece variar considerablemente, en especial modo en las regiones antárticas, en donde yo he observado con frecuencia huevos y pichones en la misma fecha y comunmente en el mismo nido.

En las Malvinas anidan de preferencia en las barrancas de la costa, junto con la gaviota cocinera (*Larus dominicanus* Licht.). Esta asociación no se observa, sin embargo, en las Shetland del Sur y en las Orcadas del Sur, en donde los gaviotines suelen atacar y expulsar a las gaviotas de las vecindades de sus nidos. En estas islas, los lugares de reproducción están situados generalmente en las gradas terminales de una morena que ya se encuentran libres de nieve. Para hacer el nido, cavan un hoyo de algunas pulgadas de profundidad, en el cual la hembra deposita uno o dos huevos. Los nidos están algo distanciados uno de otro, por lo común no menos de unas 12 yardas, a veces mucho más, encontrándose esparcidos

(1) Al traducir el presente trabajo, que nuestro consocio, señor A. G. Bennett, escribió en inglés para EL HORNERO, hemos reproducido los nombres comunes citados por el autor, traduciéndolos literalmente del inglés. — R. D.