

LISTA DE AVES DE LAS ISLAS FALKLAND

POR

RICHARD H. WACE (1)

ORDEN COLUMBIFORMES

Familia *Claraviidae*

1. *Zenaida auriculata auriculata* (Des Murs). «Paloma toreaz». — Accidental en las islas. Existen ejemplares en la colección local.

ORDEN RALLIFORMES

Familia *Rallidae*

2. *Fulica rufifrons* Phil. et Landb. «Gallareta». — Se ha reproducido en las islas, hoy es muy escasa y tal vez extinguida.
[Citada por Abbot (2) y obtenida también por la Expedición antártica inglesa (3)].

ORDEN PODICIPEDIFORMES

Familia *Podicipedidae*

3. *Podiceps Rollandi* Quoy et Gaimard. «Macá». — Se reproduce en las islas. [Señalado en el archipiélago por los capitanes Paek y Abbott, por Darwin, por la Misión científica francesa al Cabo de Hornos y por Brooks (4), Vallentin (5), etc.].
4. *Podiceps calipareus calipareus* Less. «Macá plateado; blanquillo». — Se reproduce en las islas.
[Señalado por Abbott, Darwin y otros].

ORDEN SPHENISCIFORMES

Familia *Spheniscidae*

5. *Aptenodytes patagonica patagonica*. Miller. «Pingüin Rey». — No es común, llega de vez en cuando a las islas. Existen ejemplares en la colección local.
[Citado por Abbot, Brooks y Vallentin. Nidifica en la Georgia del sur].

(1) La presente lista fué compilada por el Dr. Richard H. Wace, quien ha permanecido durante varios años en las Malvinas y especialmente en Port Darwin. Antes de su regreso a Inglaterra en 1917, me obsequió con una copia manuscrita de dicha lista, autorizándome a publicarla en algunas revistas científicas del país. Creo que este lista es hasta la fecha, la más completa que se ha hecho de las aves de las Malvinas y por consiguiente será muy oportuna su publicación en las páginas de EL HORNERO. Al copiarla, me he permitido, además de cambiar los nombres vulgares ingleses por los que comunmente se usan en la Argentina, introducir algunos cambios en la nomenclatura y añadir algunas otras especies omitidas.

También he agregado a la lista algunas notas que el Señor A. G. Bennett de Port Stanley, Malvinas, me ha enviado y en las que están indicadas algunas especies más, observadas por él, posteriormente en las islas y la distribución de otras en las Shetland y Georgia del sur. Todas estas notas figuran entre paréntesis cuadrados. R. D.

(2) The Ibis, 1861.

(3) Véase: Cat. Birds Brit. Mus.

(4) Notes on some Falkland Islands Birds; in Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll., vol. LXI, N.º 7, June 1917.

(5) Mem. Proceed. Manchester Literary and Philos. Soc., vol. 48, pt. III., 1903-1904, p. 24, cita *Podiceps dominicus*.

6. **Pygoscelis papua papua** (Forster). «Pinguin de pico anaranjado». — Se reproduce en las islas. Ejemplares en la colección local.
[Citado por Abbott, Brooks, Vallentin y Bennett (1). Nidifica también en la Georgia, Shetlands y Orcadas del sur].
7. **Pygoscelis antarctica** (Forster). «Pinguin de barbijo». — No tan común como el anterior. Hay ejemplares en la colección local.
[Citado por Abbot, Brooks y Bennett. Nidifica en las Shetlands y Orcadas del sur].
8. **Eudyptes chrysocome nigrivestis** Gould. «Pinguin de penachos amarillos, pinguin real». — Nidifica en las islas. Especímenes en la colección local.
[Citado por Abbott, Brooks y Bennett. Nidifica en la Georgia del sur].
9. **Eudyptes chrysolophus** (Brandt). «Pinguin de frente amarilla». — Común, se reproduce en las islas. Existen especímenes en la colección local.
[Citado por Abbot y otros. Nidifica en las Shetlands y Orcadas del sur].
10. **Spheniscus magellanicus** (Forster). — «Pájaro niño». — Común, se reproduce en las islas.
[Citado por Abbott, Brooks, Bennett, etc.].

ORDEN PROCELLARIIFORMES

Familia Hydrobatidae

11. **Oceanites oceanica oceanica** (Kuhl). «Pequeño petrel de las tormentas». — Común en los mares adyacentes a las islas. Se reproduce en las mismas (2). Existen ejemplares en la colección local.
[Señalado por Abbott. Nidifica en la Georgia del sur].
12. **Garrodia nereis Chubbi** (Mathews). «Pequeño petrel de dorso gris». — En los mares próximos a las islas. Representado en la colección local.
[Citado por Abbott. Nidifica según Bennett en las Malvinas].
13. **Fregetta melanogaster** (Gould). Un huevo perteneciente a este petrel ha sido obtenido en las Malvinas por la Expedición del «Challenger» y está conservado en el Museo Británico (Oates, Cat. Birds' Eggs, I, 1901, p. 151)].

Familia Procellariidae

14. **Ardenna gravis** (O'Reilly). — En los mares próximos a las islas.
[Obtenido cerca de las Malvinas por la Expedición antártica inglesa].
15. **Puffinus griseus chilensis** (Bp.). — El señor A. G. Bennett ha obtenido 2 ejemplares, macho y hembra, cerca de Port Stanley, en fecha II, 5, 1919. Especie nueva para las Malvinas].
16. **Priofinus cinereus cinereus** (Gm.) «Petrel gris». — En los mares próximos a las islas.
17. **Priocella antarctica antarctica** (Stephens). «Petrel plateado». — Mares adyacentes a las islas.
[Citado de Port Stanley por Wilson (3), en Julio. Nidifica en las Shetlands y Orcadas del Sur].

(1) EL HORNERO, I, N.º 3, p. 205, 1918.

(2) Según Bennett, es la especie afín *Garrodia nereis* la que se reproduce en las Malvinas.

(3) Nat. Antarct. Exped. 1901-1904. Zool., Aves.

- [18. *Thalassoica antarctica*. (Gm.). «Petrel antártico». — Citado por Abbott].
19. *Procellaria æquinoctialis æquinoctialis* (Linn.). «Petrel negro de anteojos». — En los mares adyacentes a las islas.
[Observado cerca de las Malvinas por Giglioli (1). Nidifica en la Georgia del Sur].
20. *Pterodroma Lessoni Lessoni* (Garn.). «Petrel de cabeza blanca». — En los mares adyacentes a las islas.
[Señalado por Garnot. No existen otras citaciones].
21. *Pagodroma nivea novaeseorgica* Steinen. «Petrel de las nieves». [Obtenido en las Malvinas por la Expedición antártica inglesa y por el viaje del «Rattlesnake»].
22. *Macronectes giganteus Solanderi* Mathews. «Petrel gigante». — Se reproduce en las islas.
[Citado por Abbott, Vallentin, Wilson, Brooks, Bennett. Nidifica también en la Georgia, Shetlands y Orcadas del Sur].
23. *Daption capensis capensis* (Linn.). «Petrel del Cabo, Damero del Cabo». — Mares adyacentes a las islas.
[Observado cerca de las Malvinas por Forster (2), Brooks, etc. Nidifica en la Georgia, Shetlands y Orcadas del Sur].
24. *Halobaena caerulea caerulea* (Gm.). «Petrel azulado». — Se reproduce en el Archipiélago.
[Citado por Wilson cerca de las islas y por Bennett].
25. *Pachyptila vittata Keyteli* Mathews. «Petrel azulado de pico ancho». — En los mares adyacentes a las islas. Especímenes en la colección local.

Familia Pelecanoididae

26. *Pelecanoides urinatrix Berardi* (Quoy et Gaimard). «Petrel zambullidor, golondrina de mar». — Se reproduce en las islas. Existen especímenes en la colección local.

Familia Diomedidae

27. *Diomedea exulans exulans* Linn. «Carnero del Cabo, Albatros». — En los mares adyacentes a las islas. Existen especímenes en la colección local.
[Observado por Abbott, Wilson, Brooks, Vallentin. Nidifica en la Georgia del sur].
28. *Thalassarche melanophris melanophris* (Temmin.). «Albatros, Largaton». Se reproduce en las islas.
[Citado por Abbott, por la Expedición del «Challenger», por Brooks, Bennett].
29. *Thalassogeron culminatus* (3) (Gould). «Albatros de cabeza gris». — En los mares adyacentes a las islas. Existen ejemplares en la colección local.
30. *Thalassogeron chlororhynchus chlororhynchus* (Gm.). «Albatros de pico negro y amarillo». — En los mares adyacentes a las islas.
[Citado cerca de las Malvinas por la Expedición antártica escocesa (4) y por Vallentin].

(1) Faun. Vertebr. Oceano.

(2) Voy. I, p. 489.

(3) Según Mathews, (Novit. Zoolog., XVII, p. 497, 1910 y Birds Australia, II, pt. 3, 1912, p. 278), el nombre específico debe ser *chrysostoma* Forster.

(4) Eagle Clarke, Ibis 1906, p. 177.

31. *Phoebetria palpebrata antarctica* Mathews. «Albatros obscuro». — En los mares adyacentes a las islas. Especímenes en la colección local. [Observado por los miembros de la Expedición antártica escocesa cerca de las Malvinas. Esta especie se reproduce en la Georgia del sur].

ORDEN LARIFORMES

Familia Sternidae (1)

32. *Sterna hirundinacea* Less. «Gaviotín». — Se reproduce en las islas. Especímenes en la colección local. [Señalado en las islas por Abbot, por la Expedición antártica inglesa, Brooks, Vallentin. También nidifica en las Shetlands y Orcadas del Sur].

Familia Laridae

33. *Larus glaucodes* Meyen. «Gaviota». — Se reproduce en las islas. Especímenes en la colección local. [Señalada por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por Brooks, Vallentin].
34. *Larus dominicanus* Licht. «Gaviota cocinera». — Se reproduce en las islas. Representada en la colección local. [Citada por Abbott, Brooks, Vallentin. Nidifica también en la Georgia, Shetlands y Orcadas del sur].
35. *Leucophaeus Scoresbyi* Traill. «Gaviota de pico rojo». — Se reproduce en las islas. [Citada por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por Vallentin, Brooks].

Familia Stercorariidae

36. *Catharacta skua antarctica* (Less.). «Gaviota parda». — Es migratoria y se reproduce en las islas. Especímenes en la colección local. [Citada por Abbott, por los naturalistas del «Challenger» y de la Misión Científica Francesa al Cabo de Hornos, por Brooks, Vallentin, Bennett. Nidifica también en las Shetlands y Orcadas del sur].
37. *Catharacta chilensis* (Bonap.). «Gaviota parda». — Es un raro visitante de las islas; posiblemente es más común en las del oeste del archipiélago. [No parece haber sido señalada anteriormente].

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Chionidae

38. *Chionis alba* (Gm.). «Paloma antártica». — Es migratoria. El señor A. Bonner de San Carlos, South, me informa que esta especie nidifica en la isla Speedwell. Existen ejemplares en la colección local. [Señalada en las islas por Darwin (2), Brooks. Se reproduce en la Georgia, Shetlands y Orcadas del sur].

(1) Cf. Ridgway, Bull. N. S. Nat. Mus N.º 50, Part. VIII, 1919, p. 449.

(2) Gould in Darwin, Voy. "Beagle", Birds, III, p. 118 (1841).

Familia *Thinocorythidae*

39. *Attagis malouinus* (Bodd.). «Toshti». — Accidental en las islas.
[Citado por Abbott].

Familia *Arenariidae*

40. *Arenaria interpres morinella* (Linn.). «Chorlito, Batuirá». — Es un raro visitante de las islas.

Familia *Haematopodidae*

41. *Haematopus leucopus* Garnot. «Ostrero overo». — Nidifica en las islas. Ejemplares en la colección local.
[Citado por Abbott, por la Expedición del «Challenger», por Brooks, Vallentin, Bennett].
42. *Haematopus Quoyi* Brab. et Chubb (nom. nov. pro *ater* Sharpe, nec Vieillot). «Pipilen negro, Ostrero negro». — Nidifica en las islas. Representado en la colección local.
[Citado por Abbott, la Expedición antártica inglesa, Brooks, Vallentin, Bennett].

Familia *Charadriidae*

43. *Oreophilus ruficollis ruficollis* (Wagl.). «Chorlo cabezón, chorlo canela, pollo del campo, pachurrón». — Un raro visitante de las islas.
[Citado por la Expedición antártica inglesa].
44. *Belonopterus cayennensis chilensis* (Mol.). «Teru». — Visita de vez en cuando las islas. Especimen en la colección local.
[Citado por Abbott].
45. *Zoniptyx modestus* (Licht.). «Chorlito» — Semimigratorio, algunos individuos se quedan todo el año en las islas.
[Citado por Abbott, por Plate ⁽¹⁾, por Brooks, por el viaje del «Challenger»].
46. *Charadrius falklandicus* Lath. «Angelito, chorlito». — Se reproduce en las islas.
[Citado por la Expedición antártica inglesa, por Abbott, Brooks, Vallentin].

Familia *Scolopacidae*

47. *Mesoscolopax borealis* (Forster). «Chorlo». — Un raro visitante de las islas.
[Citado por Abbott. Hoy, probablemente extinguido].
48. *Limosa haemastica* (Linn.). «Becasina de mar». — Raro visitante.
[Citado por Darwin y por Abbott].
49. *Erolia* ⁽²⁾ *Bairdi* (Coues). «Pollito de mar, chorlito». — Migratorio.
[No señalado anteriormente en las Malvinas].
50. *Erolia fuscicollis* (Vieill.). «Chorlito». — También migratorio.
[Señalado por la Expedición del «Challenger», por la Expedición antártica inglesa, por Abbott, Brooks].
51. *Gallinago paraguayae* (Vieill.). «Becasina». — Nidifica en las islas.
[Observada por Darwin, Abbott, W. Burnett y Fitzroy, por los naturalistas del «Challenger», del Rattlesnake y de la Expedición antártica inglesa, por Brooks, Vallentin].

(1) Schalow Zool. Jahrb. Suppl. IV, p. 666, 1898.

(2) Cf. The Ibis, eleventh Ser., vol. III, N.º 2, April 1921, p. 312.

52. **Gallinago gigantea** (Temm.). «Becasa». — Especie migratoria. Especímenes en la colección local.

[Esta especie no había sido aun señalada en una región tan austral como las Malvinas y su presencia en dichas islas debe ser accidental].

Familia **Phalaropodidae**

53. **Steganopus tricolor** Vieill. «Chorlito». — Raro visitante de las islas. [Señalado por Selater ⁽¹⁾].

Además de las enumeradas, otras especies de chorlos deben visitar las islas durante sus migraciones.

ORDEN ARDEIFORMES

Familia **Plataleidae**

54. **Ajaia ajaja** (Linn.). «Espátula rosada». — Accidental. Raras veces visita las islas.

[Señalada anteriormente por Abbott].

Familia **Threskiornithidae** (2)

- [55. **Theristicus melanopsis** (Gm.). «Bandurria». — Obtenida por A. G. Bennett en Abril 1917].

Familia **Ardeidae**

56. **Ardea cocoi** Linn. «Garza mora». — Un frecuente visitante de las islas. [No señalada anteriormente].

57. **Casmerodius albus egretta** ⁽³⁾ (Gm.). «Garza blanca». — Muy raro visitante. Representado en la colección local.

58. **Nycticorax cyanocephalus falklandicus** Hartert. «Bruja, cachi, pájaro yaguá». — Nidifica en las islas.

[Señalado por Abbott, por el viaje del «Challenger», por Brooks].

ORDEN PHOENICOPTERIFORMES

Familia **Phoenicopteridae**

59. **Phoenicopus chilensis** Mol. «Flamenco». — Raro visitante de las islas. Representado en la colección local.

ORDEN ANSERIFORMES

Familia **Anatidae**

60. **Cygnus melanocoryphus** (Mol.). «Cisne de cuello negro». — Nidifica en las islas.

[Citado por Abbott, Vallengin, Leconte].

61. **Coscoroba coscoroba** (Mol.). «Ganso». — Visita con frecuencia las islas. [Citado por Abbott y por la Expedición del «Challenger»].

62. **Chloephaga hybrida malvinarum** Phillips. ⁽⁴⁾ «Avutarda». — Nidifica en las islas.

[Citada por Darwin, Abbott, por el viaje del «Challenger», por la Expedición antártica inglesa, por Vallengin, Plate, Brooks, Bennett, etc.].

(1) Bull. B. O. Club, IV N.º XXI, p. VI, 1894.

(2) Reemplaza Ibididae. Cf. Auk, XXXVII, p. 441, 1920.

(3) Cf. Oberholser, Auk, XXXVI, N.º 4. Oct. 1919, pg. 357-58 y Auk XXXVII, 1920, p. 440.

(4) Auk, Oct. 1916, vol XXXIII, p. 423-24.

63. *Chloephaga leucoptera* ⁽¹⁾ (Gm.). [= *Chl. magellanica* auct.]. «Avutarda». — Nidifica en las islas. Probablemente es semimigratoria.
[Citada por Darwin, Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por W. Burnett y Fitzroy; por el viaje del «Rattlesnake», por Vallentin, Brooks, Bennett].
64. *Chloephaga rubidiceps* Selater. «Avutarda». — Nidifica en las islas.
[Citada por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por Brooks].
65. *Chloephaga poliocephala* G. R. Gray. «Avutarda, Guayata». — Accidentalmente visita las islas.
[Citada por Abbott, Leconte. Ultimamente (Agosto 1920) llegaron a las islas muchos ejemplares, según me lo ha comunicado el señor Bennett].
66. *Lophonetta* ⁽²⁾ *cristata cristata* (Gm.). «Pato crestado, pato juyal». — Nidifica en las islas.
[Citado por la Expedición antártica inglesa, por Abbott, Vallentin, Brooks].
67. *Mareca sibilatrix* (Poeppig). «Pato overo, chirirí». — Nidifica en las islas. Especímenes en la colección local.
[Citado por Abbott y por la Expedición antártica inglesa].
68. *Nettion flavirostre* (Vieill.). «Pato barcino chico, pato jergón chico». — Nidifica en las islas.
[Citado por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por Vallentin, Brooks].
69. *Poecilometta* ⁽³⁾ *spinicauda* (Vieill.). «Pato barcino, pato jergón grande». — Visita de vez en cuando las islas.
70. *Poecilometta bahamensis rubrirostris* ⁽⁴⁾ (Vieill.). «Pato de campo, pato gargantilla». — Visita algunas veces las islas.
[Citado por Abbott].
71. *Querquedula versicolor* (Vieill.). «Pato argentino, pato capuchino». — Nidifica en las islas.
La descripción que el Catálogo del Museo Británico da de esta especie, no parece enteramente exacta. El pico es azul como en la variedad *Q. puna* de la región andina, y también he notado otras diferencias en la coloración del plumaje.
[Citado por Abbott y por la Expedición antártica inglesa].
72. *Querquedula cyanoptera* (Vieill.). «Pato colorado». — Se reproduce en las islas. Especímenes en la colección local.
[Señalado por Abbott].
73. *Spatula platalea* (Vieill.). «Pico de cuchara». — Visita de vez en cuando las islas.
[Señalado por Leconte].

(1) [*Anas magellanica* Gmelin, Syst. Nat. I, II, 1789, p. 505. — Straits of Magellan, no es sostenible por haber ya sido empleado por Sparrman, Mus. Carlson., fasc. II, 1787, t. 37—Straits of Magellan; y es sinónimo de *Anas hybrida* Mol. 1782. Por consiguiente deberá emplearse para la avutarda magallánica, el nombre: *Anas leucoptera* Gmelin, Syst. Nat., I, II, 1789, p. 505—Falkland Isls—Cf. Oberholser, Proc. Biol. Soc. Wash., vol. XXX, March 31, 1917, p. 75].

(2) [*Lophonetta* Riley, Proc. Biol. Soc. Wash. vol. 27, May. 11, 1914, p. 100; tipo *Anas cristata* Gm. Cf. Richmond, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 53, p. 599, 1917].

(3) Cf. Bangs, Proc. New Engl. Zool. Club, VI, Oct. 31, 1918, p. 87.

(4) [Cf. Bangs, loc. cit., p. 88].

74. *Heteronetta atricapilla* (Merrem). «Pato cabeza negra». — Visita raramente las islas.
- [75. *Metopiana peposaca* (Vieill.). Citada últimamente por Bennett. Es nueva para las islas].
76. *Tachyeres cinereus* (Gm.) «Pato vapor». — Nidifica en las islas. [Señalado por Pernetty, Penrose, Abbott, por el viaje del «Challenger», por la Expedición antártica inglesa, por Vallentin, Brooks, Bennett.].
77. *Tachyeres cinereus* var. [*Tachyeres patachonicus* (King.)]. — Pato vapor». — Especie dudosa. Nidifica en las islas y los huevos son más puntiagudos que los de la especie anterior. También vuela bien y a considerable altura.

[Desde mucho tiempo han habido varias opiniones respecto de la existencia de una o de dos especies del «Pato vapor», sin que hasta la fecha se haya resuelto definitivamente nada en este sentido. Algunos afirman que los individuos de una especie pueden volar, mientras que los de la otra, nunca se les vió levantarse en los aires. Y para la primera especie, o sea para los individuos que vuelan, los autores han conservado el nombre de *Micropterus patachonicus* que le dió King. Por lo que se refiere a los especímenes de las Malvinas, el Dr. Wace y el Sr. Bennett, afirman que el «Pato vapor» conocido en las islas con el nombre de «Canvas-back Duck» puede volar; mientras que Brooks (loc. cit., p. 155), por el contrario, dice que durante su estadía en las Malvinas, nunca tuvo la ocasión de ver volar a ninguna de estas aves. Los dos primeros observadores citados están también de acuerdo en afirmar que los huevos de las dos especies o formas de pato vapor son distintos y esta opinión está confirmada por el señor Guillermo Bridges, (Estancia Viamonte, Tierra del Fuego), quien conserva en su colección, huevos de las dos especies obtenidas en Tierra del Fuego y que el profesor Doello Jurado ha tenido ocasión de observar y comprobar también la indicada diferencia. El citado Guillermo Bridges, es asimismo del parecer de Blaauw⁽¹⁾, y de Mogensen⁽²⁾, en lo que se refiere a la facultad de volar de una de las especies de pato vapor, habiéndola visto ellos mismos en varias ocasiones.

Es posible que las aves que se vieron volar sean, como algunos observadores creen, individuos jóvenes, los cuales con el avanzar de la edad pierden esta facultad, sea por el poco uso, o por estar imposibilitados de levantarse en el aire a causa de la desproporción que ha ido tomando el cuerpo, en peso y en volúmen, comparado con el poco desarrollo natural de las alas].

78. *Erismatura vittata* Phil. «Pato zambullidor». — Accidental y observado muy pocas veces en las islas.

[Durante el largo período de sequía que tuvo lugar en el año 1916, en toda la República Argentina, muchos individuos de esta especie han emigrado muy al sur, habiendo el señor Bennett encontrado un buen número de cráneos y esternones en las islas Decepción, Shetlands del sur, en Enero de 1918. Pertenecían a individuos muertos probablemente por extenuación].

(1) The Ibis, 1916, pg. 488-492.

(2) Physis, II, Marzo 17, 1917, pg. 84-85.

ORDEN PELECANIFORMES

Familia *Phalacrocoracidae*

79. *Phalacrocorax magellanicus* (Gm.). «Viguá». — Nidifica en las islas.
[Señalado por Abbott, por el Cap. Kellett y Ten. Wood, por la Expedición antártica inglesa, por el viaje del «Challenger», por Vallentin, Brooks, Bennett].
80. *Phalacrocorax albiventer* (Less.). «Shag». — Nidifica en las islas.
[Señalado por Quoy et Gaimard, Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por el viaje del «Challenger», por Vallentin, Brooks, Bennett].
- [81. *Phalacrocorax vigua vigua* (Vieill.). «Viguá». — Garnot, ha indicado la presencia de tres especies de cormoranes en las Malvinas.
Dos son las citadas anteriormente y la tercera señalada con el nombre de *Carbo graculus*, debe ser referida a esta especie, la cual se encuentra también como las otras sobre las costas patagónicas y que accidentalmente puede visitar las Malvinas (1)].

[Familia *Sulidae*

- [82. *Sula leucogastra* (Bodd). — Garnot señala también esta especie en las Malvinas, con el nombre de *Pelecanus fiber* Gm. (2). Ha sido encontrada sobre la costa atlántica hasta el Estrecho de Magallanes, y por consiguiente no es inverosímil que accidentalmente se haya encontrado en las Malvinas].

ORDEN CATHARTIDIFORMES

Familia *Cathartidae*

83. *Cathartes aura jota* (Mol.) [= *Oenops falklandica* Sharpe. Cf. Bangs y Th. Penard, Bull. Mus. Comp. Zool. Harv. Coll., LXII, N.º 2, 1918, p. 34, texto.]. «Jote, cuervo cabeza colorada». — Nidifica en las islas. Especímenes en la colección local.
[Señalado en las islas por Abbott, por el viaje del «Challenger», por la Expedición antártica inglesa, por Brooks, Vallentin.
Esta forma de *C. aura* (L.), que algunos autores consideran dudosa, se encuentra según Bangs y Th. Penard (loc. cit.) también en Chile, Patagonia y parte este de Sud América, hasta Bahía].
- 83a. ? *Cathartes aura aura* (Linn.). — Accidental. Probablemente los individuos observados, eran jóvenes de la especie anterior, los cuales en esa edad tienen la parte desnuda de la cabeza, de un color obscuro (3).

ORDEN ACCIPITRIFORMES

Familia *Falconidae*

84. *Polyborus plancus* (Miller). «Carancho». — Nidifica en las islas.
[Señalado por Brooks].

(1) Oustalet, Miss. Scient. Cap. Horn, Oiseaux, p. 302, 1891.

(2) Oustalet, loc. cit., p. 302.

[(3) Según F. P. y A. Penard (Vogel von Guyana, 1908, 1, p. 361), en los jóvenes de *C. aura aura* (L.), la piel de la cabeza, tiene también un color obscuro].

85. *Ibycter australis* (Gm.). — Peculiar a las islas Malvinas, probablemente. Esta ave va haciéndose escasa por ser muy perseguida, aunque no es dañina.
[Citada por el viaje del «Challenger», por Abbott, W. Burnett y Fitzroy, por la Expedición antártica inglesa, por Vallentin].
86. *Falco peregrinus* Cassini Sharpe. «Halcón». — Especímenes en la colección local.
[No ha sido citado anteriormente].

Familia *Buteonidae*

87. *Circus cinereus* Vieill. «Gavilán». — Accidental en las islas.
[Citado por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por Burnett y Fitzroy].
88. *Buteo poliosomus* (Quoy et Gaimard). «Aguilucho». — Nidifica en las islas.
[Citado por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por Brooks].
89. *Buteo erythronotus* (King). «Aguilucho». — Nidifica en las islas. Especímenes en la colección local.
[Citado por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por Burnett y Fitzroy, por el Cap. Kellett, por el viaje del «Challenger»].
- Los habitantes de la campaña dicen que existen otros halcones. Uno pequeño, de color obscuro, con el pecho claro y otro grande y negro. No se han podido obtener ejemplares. Posiblemente el primero debe ser el joven o el macho de algunas de las especies mencionadas].

ORDEN STRIGIFORMES

Familia *Bubonidae*

90. *Asio flammeus* *Sanfordi* Bangs. ⁽¹⁾ «Lechuzón». — Nidifica en las islas. Especímenes en la colección local.
[Observado por el Cap. Kellett y Ten. Wood, por la Expedición antártica inglesa, por Burnett y Fitzroy, por Abbott y Vallentin].
91. *Strix rufipes* King. «Lechuza-Concón». — Nidifica en las islas. Especímenes en la colección local.
[No observado anteriormente].

ORDEN PASSERIFORMES

Familia *Hylactidae*

- [92. *Scytalopus magellanicus* (Gm.)? subsp. — Citado por Darwin (Voy. Beagle «III, 74) y por Vallentin (l. c. 44)].

Familia *Dendrocolaptidae*

93. *Cinclodes antarcticus antarcticus* (Garn.). — Nidifica en las islas.
[Citado por Abbott, por Darwin, Burnett y Fitzroy, Vallentin y Brooks. En el Cat. del Mus. Británico está indicado un ejemplar de *Siptornis anthoides* (King), como procedente de las Malvinas; y Selater (Proc. Zool. Soc. Lond. 1860, p. 385, señala *Cinclodes fuscus* (Vieill.) de las Malvinas, pero con dudas].

(1) Proc. New. Engl. Zool. Club, VI, Febr. 8, 1919, p. 97 — Falkland Isl.

Familia Tyrannidae

94. **Muscisaxicola macloviana macloviana** (Garn.). — Nidifica en las islas.
[Citada por Abbott, Leconte, Macgillivray, Brooks].
95. **Taenioptera pyrope** (Kittl.). — Señalada por Vallentin (loc. cit. p. 43].

Familia Hirundinidae

96. **Progne furcata** Baird. «Golondrina». — Es un frecuente visitante de las islas.

Familia Troglodytidae

97. **Cistothorus platensis Eydouxi** (Bp.) «Ratona». — Nidifica en las islas.
[Señalado por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por A. Smith].
98. **Troglodytes musculus Cobbi** Chubb. «Ratona». — Nidifica en las islas.
Aparentemente existen otras ratonas, una de las cuales, según Mr. F. Scott de Egg Harbour, ha sido observada en la isla Carcase y otra con las rectrices algo espatuladas ha sido vista en Darwin y Walker Creek, hace unos años. Miss Faltón, de West Point, ha descrito una pequeña ratona de color gris la cual frecuenta esa región.

Familia Turdidae

99. **Planesticus magellanicus falklandicus** (Quoy et Gaimard). «Zorzal». — Nidifica en las islas.
[Señalado por la Expedición antártica inglesa y por Brooks].

Familia Motacillidae

100. **Anthus correndera Phillipsi** Brooks. (1) «Cachila». — Nidifica en las islas.
[Señalada por Abbott, la Expedición antártica inglesa, Vallentin, Brooks].

Familia Fringillidae

101. **Phrygilus malvinarum** Brooks. (2) «Canario de las Malvinas». — Nidifica en las islas. Especímenes en la colección local.
[Citado por Abbott y Brooks].
102. **Phrygilus melanoderus** (Quoy et Gaimard). — Nidifica en las islas.
[Señalado por Abbott, por la Expedición antártica inglesa, por el viaje del «Challenger» y del «Rattlesnake», por Fitzroy, Vallentin, Plate, Brooks].
103. **Phrygilus xanthogrammus** (Gray). — Accidental, en las islas.
[Señalado por la Expedición antártica inglesa, por Macgillivray].
104. **Passer domesticus** (L.). — En Nov. 1919 llegó a las Malvinas sobre buques (Bennett)].

Familia Icteridae

105. **Trupialis militaris falklandicus** Leverk. — «Pecho colorado». — Peculiar en las islas.
[Señalado por Abbott, Leconte, Vallentin, Brooks].

(1) Proc. N. E. Zool. Club, VI, p. 26-27, 1919.

(2) Proc. N. E. Zool. Club, VI p. 25-26, 1919.