

gradualmente a su nueva vida, aunque siempre muy asustadizo; comiendo regularmente desde entonces *purée* de papas mezclada con yema de huevo hervido, alternando con banana, naranja y lechuga. Régimen al que se adaptó perfectamente, aunque sin despreciar a veces algún insecto que se le da, como ser langosta u otro, que come con fruición arrancándole hábilmente la cabeza para extraer los órganos y jugos internos, sujetándolo con la pata, a modo de rapaz.

Pocos meses después de su captura, o sea en la primavera de 1915 empezó a cantar, siguiendo con más intensidad en el verano, para cesar durante la muda y casi completamente en el invierno. Su canto, que a veces tiene algo del silbido del mirlo o del zorzal, es original y delicado, muy variado y difícil de expresar, llamando particularmente la atención su tendencia a imitar el de otros pájaros vecinos, como ser una cotorra, *Myiopsitta monachus* (BODD.), un cabecita negra, *Spinus ictericus* (LICHT.) y un canario, hasta el punto de confundirse muchas veces con ellos.

Está en continuo movimiento, saltando y haciendo piruetas repetidas como jugando, prendido de los tramos laterales de la jaula y antes que bajar al piso para comer, adopta la postura común en los loros o trepadoras, es decir colgándose de los barrotes con la cabeza hacia abajo, para alcanzar así el alimento.

Después de dos años de experiencia, queda pues, probado que este Boyerito puede ser fácilmente domesticado y brindarnos así el encanto de sus melodías.

PEDRO SERIÉ.

#### DOS TIRÁNIDOS DE BUENOS AIRES

En un viaje que hice al oeste de Buenos Aires (Timote, F. C. S.), tuve la suerte de cazar un *Agriornis striata*, GOULD, especie bastante rara aquí, pues, aunque últimamente la trajó don DEMETRIO RODRÍGUEZ de San Luis, solamente había sido colecciónada en la provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora) por WITHERINGTON; así que creí de interés mencionarla nuevamente.

En el mismo viaje cacé también la *Taenioptera murina* SCL., que aun cuando es común en la Patagonia y en todo el interior, no había sido señalada todavía en Buenos Aires; y recientemente también la he conseguido en Morón, en los alrededores de Buenos Aires, en un campo arado. En esa localidad he observado también la *Taenioptera cinerea* (VIEILL.) y la *T. coronata* (VIEILL.).

HÉCTOR AMBROSETTI.

---

*CYPSELOIDES SENEX* (TEMMINCK) Y *CLIBANORNIS DENDROCOLATOIDES* (PELZELN) EN MISIONES (R. A.)

El conocido coleccionista señor FRANCISCO MANUEL RODRÍGUEZ, establecido desde hace algún tiempo en Santa Ana, Misiones, ha enviado al señor HÉCTOR AMBROSETTI varios ejemplares de las especies arriba indicadas y un espécimen de cada una ha sido adquirido por canje para la colección del Museo Nacional de Historia Natural. *Cypseloides senex* pertenece al grupo de las aves llamadas comúnmente vencejos, y era conocida hasta ahora sólo del Brasil meridional y del Paraguay (BERTONI). Aunque su presencia al sur del Río Paraná era de esperarse, esta es la primera vez que está señalada en territorio argentino. Ha sido obtenido en el mes de Enero del presente año.

La segunda especie pertenece a la familia de los Dendrocóptidos, y es un ave bastante escasa. Habita también el Brasil meridional y el Paraguay. El señor WINKELRIED BERTONI la señala en Misiones, aunque sin especificar la localidad: por consiguiente, esta es la primera vez que es obtenida en territorio argentino.

ROBERTO DABBENE.

---